

Preguntas desafiantes con respuestas alternativas. Corrobore la suya mediante el código QR o abriendo la página web de cada una.

**DD 1** ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son características del nebivolol?



- A** Es un bloqueante selectivo de tercera generación, lipofílico, del receptor beta1.
- B** Tiene efectos vasodilatadores mediados por el óxido nítrico.
- C** No tiene actividad estabilizadora de la membrana.
- D** Bloquea al receptor alfa1.
- E** Todas las respuestas son correctas..

[www.siicsalud.com/dato/evaluacioneshtm.php/162440](http://www.siicsalud.com/dato/evaluacioneshtm.php/162440)



**Lectura recomendada:**  
*A Critical Review of Nebivolol and its Fixed. Dose Combinations in the Treatment of Hypertension*  
*Drugs 78(17):1783-1790*


**Resumen SIIC en castellano**  
[www.siic.info/dato/resiic.php/162440](http://www.siic.info/dato/resiic.php/162440)

**DD 3** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a los fármacos inhibidores de la agregación plaquetaria?



- A** El prasugrel es un inhibidor de la agregación plaquetaria.
- B** El ticagrelor es un inhibidor de la agregación plaquetaria.
- C** Los pacientes con diabetes mellitus tienen riesgo aumentado de sangrados.
- D** El riesgo aterotrombótico en pacientes con diabetes mellitus es de etiología multifactorial.
- E** Todas las afirmaciones mencionadas son correctas.

[www.siicsalud.com/dato/evaluacioneshtm.php/160505](http://www.siicsalud.com/dato/evaluacioneshtm.php/160505)



**Lectura recomendada:**  
*Prasugrel or Ticagrelor in Patients with Acute Coronary Syndrome and Diabetes: a Propensity Matched Substudy of RENAMI*  
*European Heart Journal. Acute Cardiovascular Care 16(2):130-142*

**Resumen SIIC en castellano**  
[www.siic.info/dato/resiic.php/160505](http://www.siic.info/dato/resiic.php/160505)

**DD 2** En relación con la disfunción eréctil y la enfermedad cardiovascular, señale la respuesta correcta:



- A** La disfunción sexual afecta a millones de personas por año y comparte factores de riesgo con la enfermedad cardiovascular.
- B** Los pacientes con enfermedad cardiovascular o factores de riesgo para esta entidad tienen mayor probabilidad de presentar disfunción eréctil.
- C** Los pacientes con diabetes presentan tres veces mayor riesgo de tener disfunción sexual.
- D** La presencia de disfunción eréctil se relacionó con dos veces más riesgo de presentar infarto agudo de miocardio.
- E** Todas las respuestas son correctas.

[www.siicsalud.com/dato/evaluacioneshtm.php/160097](http://www.siicsalud.com/dato/evaluacioneshtm.php/160097)



**Lectura recomendada:**  
*Sexual Dysfunction, Cardiovascular Risk and Effects of Pharmacotherapy*  
*Current Vascular Pharmacology 16(2):130-142*

**Resumen SIIC en castellano**  
[www.siic.info/dato/resiic.php/160097](http://www.siic.info/dato/resiic.php/160097)

**DD 4** Respecto del ácido fíbrico, el fenofibrato y el ácido fenofibrato, señale la opción correcta:



- A** El ácido fenofibrato es una prodroga.
- B** El ácido fíbrico deriva del fenofibrato y al metabolizarse origina el ácido fenofibrato, su metabolito activo.
- C** El ácido fenofibrato deriva del fenofibrato y al metabolizarse origina el ácido fíbrico, su metabolito activo.
- D** El fenofibrato deriva del ácido fíbrico y al metabolizarse origina el ácido fenofibrato, su metabolito activo.
- E** El metabolismo del ácido fenofibrato origina fenofibrato y ácido fíbrico, ambos metabolitos activos.

[www.siicsalud.com/dato/evaluacioneshtm.php/163161](http://www.siicsalud.com/dato/evaluacioneshtm.php/163161)



**Lectura recomendada:**  
*Anti-inflammatory Activity of Anti-hyperlipidemic Drug, Fenofibrate, and its Phase-I Metabolite Fenofibric Acid: in Silico, in Vitro, and in Vivo Studies*  
*Inflammopharmacology 26(4):973-981*

**Resumen SIIC en castellano**  
[www.siic.info/dato/resiic.php/163161](http://www.siic.info/dato/resiic.php/163161)

# NEBIX

NEBIVOLOL

## ÚLTIMA GENERACIÓN EN BETABLOQUEANTES

### UN **BETABLOQUEANTE** DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA LA **HIPERTENSIÓN ARTERIAL**

- NEBIX es un betabloqueante selectivo de última generación. <sup>1,2,3</sup>
- NEBIX no induce disfunción sexual en hombres hipertensos. <sup>4</sup>
- NEBIX posee notables propiedades vasodilatadoras con el mejor perfil de seguridad y tolerabilidad. <sup>1,2,5</sup>

**Presentaciones:**  
Nebix 5/10 mg: envases por 30 comprimidos



NIX 015

(1) Kamp O, et al. Nebivolol: haemodynamic effects and clinical significance of combined beta-blockade and nitric oxide release. *Drugs*. 2010;70(1):41-56. (2) Giles TD. The role of vasodilating beta-blockers in patients with complicated hypertension: focus on nebivolol. *Am J Med*. 2010 Jul;123(7 Suppl 1):S16-20. (3) Brixius K, et al. Nebivolol, bucindolol, metoprolol and carvedilol are devoid of intrinsic sympathomimetic activity in human myocardium. *Br J Pharmacol*. 2001 Aug;133(8):1330-8. (4) Brixius K, et al. Nitric oxide, erectile dysfunction and beta-blocker treatment (MR NOED study): benefit of nebivolol versus metoprolol in hypertensive men. *Clin Exp Pharmacol Physiol*. 2007 Apr;34(4):327-31. (5) Espinola-Klein C, et al.  $\beta$ -Blockers in patients with intermittent claudication and arterial hypertension: results from the nebivolol or metoprolol in arterial occlusive disease trial. *Hypertension*. 2011 Aug;58(2):148-54.