

La colección **Excelentes Residentes** destaca los artículos principales publicados durante el trimestre anterior en la sección *ACisE Residentes* del sitio *siicsalud* (www.siicsalud.com/residentes). Los breves conceptos y referencias que acompañan a los títulos permiten elegir los artículos que el lector podrá consultar ampliados copiando las direcciones de sus páginas o mediante el escaneo del correspondiente código CRR.

Excelentes Residentes, serie **Cardiología**, es una publicación que integra el programa Actualización Científica sin Exclusiones (ACisE) para Residentes en Cardiología de Argentina (ACisERA en Cardiología).*

Nº 6, septiembre 2014



Salud i Ciencia
19(6):519-523,
Mar 2013

Tratamiento del Infarto de Miocardio con Elevación del Segmento ST en el Anciano

Revisión de la evidencia existente en cuanto a la reperusión farmacológica o mecánica en el infarto agudo de miocardio que ocurre en pacientes ancianos. Se valoraron los riesgos y las limitaciones de la fibrinólisis y de la angioplastia primaria, y se analizaron sus beneficios.

Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII, Tarragona, España
www.siicsalud.com/dato/arsiiic.php/126106



Revista del CONAREC
29(121):232-234,
Sep 2013

Percepciones acerca del Consumo de Aguas Mineralizadas y la Presión Arterial

El consumo de agua con bajo contenido en sodio no parece relacionarse con los niveles de presión arterial. Se reconoce que la ingesta de agua con escasa mineralización no se asociaría con efectos cardioprotectores demostrados en la bibliografía científica.

Sanatorio de la Trinidad-Mitre, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/143158




Advances in Therapy
31(7):762-775, Jul 2014

La Combinación de Dosis Fijas de Valsartán y Amlodipina es Segura y Eficaz para Reducir la Presión Arterial

La combinación de dosis fijas de 80 mg de valsartán y 5 mg de amlodipina se asoció con un efecto antihipertensivo seguro y eficaz, con una elevada proporción de pacientes que alcanzan las metas de tratamiento con pocos eventos adversos.

Peking University People's Hospital, Beijing, China
www.siicsalud.com/dato/insiiic.php/143032




Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo 55(1):31-37, Ene 2013

Control Parasimpático de la Frecuencia Cardíaca y Anticuerpos Antimuscarínicos en Pacientes con Enfermedad de Chagas

El efecto colinérgico agonista de los autoanticuerpos con efecto muscarínico explica la heterogeneidad de las respuestas cronotrópicas a las pruebas de control autonómico de la frecuencia cardíaca, en los enfermos chagásicos.

Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela
www.siicsalud.com/dato/crosiic.php/135626



Insuficiencia Cardíaca
8(1):9-14, Ene 2013

Tromboembolismo Pulmonar: Papel del Dímero D

Los valores de dímero D positivos no representan una ayuda para el diagnóstico y el tratamiento del tromboembolismo pulmonar en la Unidad Coronaria. Por lo tanto, la gammagrafía pulmonar sigue recomendándose como prueba diagnóstica fundamental ante la sospecha de dicha complicación.

Centro Modelo de Cardiología, Catamarca, Argentina
www.siicsalud.com/dato/crosiic.php/139019



Journal of the American College of Cardiology
63(14):1441-1448, Abr 2014

Valores Superiores de Normalidad para la Troponina Cardíaca T Ultrasensible

Más del 10% de los varones de 65 a 74 años, sin enfermedad cardiovascular, tuvo niveles de troponina T cardíaca ultrasensible por encima del umbral considerado para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio.

University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, EE.UU.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/141821



Evidence-Based Medicine 19(4):
123-131, Ago 2014

Una Herramienta para Cuantificar el Entorno Educativo para el Modelo de Medicina Basada en la Evidencia

Se describe el desarrollo de la herramienta EBMEEM-67 como recurso para la cuantificación de las variables del entorno educativo en estudiantes y profesionales de la salud, en el marco del modelo de

University of Pretoria, Pretoria, Sudáfrica
www.siicsalud.com/dato/insiiic.php/143148



American Journal of Emergency Medicine
31(12):1646-1650,
Dic 2013

Variables Relacionadas con el Diagnóstico Incorrecto o Demorado de la Embolia Pulmonar

Dadas las diversas modalidades de presentación de la embolia pulmonar, se observa un frecuente retardo en su diagnóstico. No obstante, esto no parece asociarse con una mayor gravedad o con aumento de la mortalidad.

Hospital Universitario Infanta Cristina, Madrid, España
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/141815

