


Tofacitinib en la Artritis Reumatoidea Activa

La administración del inhibidor de la janoquinasa, tofacitinib, en combinación con metotrexato o como monoterapia, produce una mejoría estadísticamente significativa, rápida y sostenida del dolor, del desempeño funcional y de la calidad de vida de los pacientes con artritis reumatoidea activa.

Metroplex Clinical Research Center, Dallas, EE.UU.

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/152858 ▶

Clinical and Experimental Rheumatology 34(3): 430-442, May 2016



Desgarro del Ligamento Cruzado Anterior: Mecanismos Compensatorios en la Actividad Muscular

El desgarro del ligamento cruzado anterior activa dos mecanismos compensatorios para evitar la agudización de la lesión en la articulación de la rodilla; éstos son la disminución de la fuerza ejercida por los músculos isquiotibiales y los cuádriceps.

Korea University College of Medicine, Seúl, Corea del Sur

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/152859 ▶

PLoS One 11(1), Ene 2016



Lesiones sobre Césped Artificial en Futbolistas Profesionales Jóvenes

La tasa de lesiones sobre superficie de césped sintético, en futbolistas profesionales jóvenes, varones, es relativamente baja y similar a la descrita para el césped natural.

Universitá di Palermo, Palermo, Italia

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/152857 ▶

Asian Journal of Sports Medicine 7(1):28425, Mar 2016



Dolor en la Tendinopatía del Manguito Rotador

Existen diferencias en los receptores glutamatérgicos específicos (como el metabotrópico tipo 2 y 7 y el de kainato tipo 1) y el número de células inflamatorias (que expresan CD45 y CD206), asociadas con la resolución del dolor en la tendinopatía del manguito rotador.

University of Oxford, Oxford, Reino Unido

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/152860 ▶

Arthritis Research & Therapy 17(176), Jul 2015

