

**Novedades Destacadas** resalta artículos publicados en el último trimestre en *siicsalud*, el sitio oficial de la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC). Los conceptos que acompañan a los títulos derivan hacia los artículos completos que el lector podrá consultar copiando las direcciones de sus páginas o mediante el escaneo del correspondiente CRR (Código Respuesta Rápida)\*.

## Efectividad de la Teriparatida en la Reducción del Riesgo de Fracturas Osteoporóticas



La teriparatida resultó más eficaz en reducir el riesgo de fracturas por fragilidad, ya a los 6 meses, con un beneficio continuo del tratamiento hasta 24 meses en comparación con una cohorte emparejada sin dicho fármaco.

Eli Lilly and Company, Indianápolis, EE.UU.

◀ [www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149757](http://www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149757)



Current Medical Research and Opinion, Jun 2015

## Impacto del Tratamiento con Teriparatida en la Calidad de Vida de las Personas con Osteoporosis



El uso de teriparatida en pacientes con osteoporosis se asocia con reducción considerable del dolor y mejoría en la calidad de vida, además de reducción en el número de fracturas. Se observó mejoría en la calidad de vida y en el dolor en un 65% y 80% de los pacientes tratados, respectivamente.

Hospital Obispo Polanco, Teruel, España

◀ [www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149758](http://www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149758)



Revista Española de Salud Pública 89(2):215-225, Mar 2015

## Papel de la Teriparatida sobre el Dolor de Espalda de Pacientes con Osteoporosis Grave en Comparación con Inhibidores de la Resorción



Los pacientes de India tratados con teriparatida presentaron riesgo de dolor de espalda nuevo o empeoramiento de éste y mínimo riesgo de dolor de espalda grave, similares a lo visto en sujetos tratados con inhibidores de la resorción a los 6 meses de tratamiento.

All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, India

◀ [www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149759](http://www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149759)



Indian Journal of Endocrinology and Metabolism 19(4): 483-490, Jul 2015

## Teriparatida en Osteoporosis



En pacientes japoneses con osteoporosis y alto riesgo de fracturas tratados con teriparatida, la incidencia de fracturas clínicas tras 6 y 12 meses fue de 2.9% y 3.7%, respectivamente. Este fármaco se asoció con mayor densidad mineral ósea lumbar y mayor concentración de biomarcadores de formación ósea, además de mejoría en los puntajes de dolor y de calidad de vida relacionada con la salud, con un perfil de seguridad adecuado.

Kinki University Faculty of Medicine, Osaka, Japón

◀ [www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149815](http://www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149815)



Current Medical Research and Opinion 31(9): 1771-1779, 2015