

Novedades en Trastorno Bipolar Epilepsia



Los Estabilizadores del Estado de Ánimo Pueden Alterar el Funcionamiento Sexual en el Trastorno Bipolar

La evaluación del funcionamiento sexual de los pacientes eutímicos con trastorno bipolar, tratados con estabilizadores del estado de ánimo, debe ser parte de la práctica diaria, ya que ese componente compromete la calidad de vida y, por lo tanto, la adhesión al tratamiento.



Journal of Sexual Medicine
17(5):930-940, Mar 2020



Respuesta a Largo Plazo a Litio, Valproato o Lamotrigina en Pacientes con Trastorno Bipolar

Si bien los estabilizadores del estado de ánimo –litio, ácido valproico y lamotrigina– han sido eficaces en pacientes con trastorno bipolar evaluados en estudios clínicos, la respuesta al tratamiento prolongado en la práctica diaria es variable y aún no se conocen los factores predictivos de la evolución.



Plos One
15(1): 1-12, Ene 2020



Riesgo de Diabetes con los Fármacos Utilizados en el Trastorno Bipolar

En este estudio se comparó el riesgo de diabetes entre más de cien fármacos y sus combinaciones, utilizados en el trastorno bipolar, debido a que estos fármacos podrían provocar anomalías en el metabolismo de la glucosa y resistencia a la insulina.



Psychoneuroendocrinology
112:1-9, Feb 2020



Lamotrigina más Ácido Valproico respecto de Carbamazepina de Liberación Controlada como Esquema Terapéutico Inicial en la Epilepsia no Tratada

En los pacientes con convulsiones parciales o convulsiones tónico-clónicas generalizadas sin tratamiento, la combinación de lamotrigina más ácido valproico, una vez por día, sería una alternativa válida al uso de carbamazepina de liberación controlada, dos veces por día. Esta pauta, sin embargo, no es aplicable a las mujeres en edad reproductiva.




Seizure
55:17-24, Feb 2018



Encuestas entre Especialistas: La Brecha entre la Evidencia Científica y la Práctica Clínica

Los fármacos antiepilépticos (FAE) son el tratamiento de primera línea para esta enfermedad y cerca del 70% de estos pacientes puede tener una vida normal con la farmacoterapia adecuada. Se prescriben cerca de 1.76 FAE por cada paciente epiléptico, y los más indicados valproato, carbamazepina y topiramato.



Epilepsy & Behavior
105:1-6, Abr 2020



Ajuste de la Dosis de Lamotrigina durante el Embarazo según la Monitorización Terapéutica del Fármaco

La lamotrigina es eficaz para el tratamiento de la epilepsia durante el embarazo debido a la escasez de efectos adversos para la madre y el feto, aunque sufre variaciones farmacocinéticas que influyen en la frecuencia de las convulsiones y en los requerimientos farmacológicos.



Brain and Behavior
9(7):1-6, Jul 2019

