

Efectividad del Aripiprazol en el Tratamiento del Trastorno del Espectro Autista (TEA)

Revisión sistemática y metanálisis

Pacientes con TEA

11.2 ± 6.3 años
n = 2856



Tratamiento de la
desregulación emocional
e irritabilidad (DE/I)

Mejoría de la DE/I

Aripiprazol 
Risperidona
y otros*

Placebo 

* Antipsicóticos y fármacos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Algunas intervenciones farmacológicas, particularmente el aripiprazol y la risperidona, son efectivas en el corto plazo para el tratamiento de la DE/I en pacientes con TEA.

JAA
CAP

Systematic Review and Meta-analysis: Efficacy of
Pharmacological Interventions for Irritability and Emotional...

Abr 2022

DOI: 10.1016/j.jaac.2022.03.033

King's College London, Londres,
Reino Unido

Los pacientes con TEA pueden presentar desregulación emocional e irritabilidad, de ahí la importancia de encontrar fármacos efectivos para el tratamiento en niños y adolescentes; solo el aripiprazol y la risperidona han sido aprobados para esta indicación en dicha población.

Resumen SIIC (ReSIIC)

Intervenciones Farmacológicas en el Trastorno del Espectro Autista

Texto Completo Autorizado TCA (full text) [Systematic Review and Meta-analysis: Efficacy of Pharmacological Interventions for Irritability and Emotional...](#)



Ingrese al ReSIIC