

Anticipos SNC

Los artículos de Anticipos han sido escogidos por la dirección médica el día anterior a la culminación de la presente edición. Aquí sólo adelantamos los resúmenes de sus conclusiones.

Las versiones completas, redactadas por SIIC, integrarán futuros Trabajos Distinguidos en la medida en que sean seleccionadas por el Comité de Expertos de la especialidad.

Observan descenso significativo de la mortalidad neonatal en mujeres con preeclampsia

En Noruega, durante los últimos 37 años se observó un descenso significativo de la mortalidad asociada con la preeclampsia, posiblemente relacionado con la mayor frecuencia con que se indica la inducción del parto y el mejor manejo clínico de la preeclampsia, si bien la tasa de mortalidad neonatal se mantuvo bastante estable en el lapso considerado.

[JAMA]

El sistema intrauterino liberador de levonorgestrel no afecta el metabolismo de los hidratos de carbono

El anticonceptivo liberador de levonorgestrel no altera el metabolismo de la glucosa, por lo que podría ser utilizado en mujeres con diabetes.

[Obstetrics & Gynecology]

La escisión del fórnix vaginal posterior mejora los resultados de la laparoscopia en la endometriosis profunda

La resección incompleta del tejido endometriósico en pacientes con endometriosis profunda rectovaginal conduce a recurrencias y progresión de la enfermedad, por lo que los autores proponen la resección del fórnix vaginal posterior durante la cirugía laparoscópica.

[Human Reproduction]

Opinan sobre la reducción del número de embriones en embarazos múltiples

La disminución no selectiva del número de embriones en los casos de embarazos múltiples es una práctica que debería ser desalentada ya que no existen estudios que demuestren beneficio alguno, a corto o a largo plazo, para los embriones restantes.

[Journal of Perinatal Medicine]

Hombres y mujeres adoptan diferentes estrategias para sobrellevar el estrés asociado a la infertilidad

Existen importantes diferencias en las conductas adoptadas por ambos sexos para sobrellevar el estrés relacionado con la infertilidad. Sin embargo, en los dos casos los mayores niveles de estrés se correlacionan con la adopción de conductas de evitación del problema o de aceptación de la responsabilidad.

[Human Reproduction]

Describen opciones terapéuticas para la vaginitis atrófica

Aunque la atrofia urogenital es consecuencia natural de la menopausia, los síntomas asociados frecuentemente repercuten sobre la calidad de vida de las mujeres, por lo que es importante que los médicos detecten tempranamente su presencia e indiquen el tratamiento.

[Journal of the American Academy of Physician Assistants (JAAPA)]

En el trabajo de parto prematuro con membranas intactas los antibióticos no modifican la evolución

En las pacientes con embarazos de 24 a 34 semanas de gestación en trabajo de parto prematuro y con membranas intactas, la administración de clindamicina y gentamicina durante 7 días no mejora la evolución materna ni perinatal con respecto a la no implementación de dicha terapia.

[Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine]

Trastornos psíquicos asociados al síndrome de anovulación crónica

Revisión del síndrome de ovarios poliquísticos: aspectos etiopatogénicos, clínicos, diagnósticos y terapéuticos.

[Revista de Psiquiatría Clínica]

Describen trastornos asociados con el herpes orofacial recurrente en el embarazo

Las mujeres embarazadas con herpes orofacial presentan mayor incidencia de náuseas y vómitos graves, amenaza de parto prematuro y trastornos placentarios que aquellas sin la mencionada infección. Sin embargo, las primeras tienen menor riesgo de preeclampsia, y sus recién nacidos muestran mayor edad gestacional.

[Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine]

La duración de los síntomas menopáusicos luego de interrumpir la terapia de reemplazo hormonal predice su reanudación

En las mujeres posmenopáusicas que interrumpen el tratamiento hormonal, el antecedente de sofocos en el momento de la prescripción de la terapia y la duración de los síntomas menopáusicos posteriores a la suspensión de ésta representan factores predictores de la necesidad de reanudación del tratamiento después de 1 año.

[Human Reproduction]

Sólo la mitad de las embarazadas toma decisiones informadas acerca de la pesquisa prenatal

Las decisiones informadas son aquellas que han sido elaboradas sobre la base del conocimiento, con análisis de las ventajas y desventajas de las alternativas disponibles y que resultan coherentes con los valores de la persona. Al respecto, los resultados del presente trabajo demuestran que sólo el 51% de las embarazadas toma decisiones de estas características con relación a la pesquisa prenatal.

[Patient Education and Counseling]

Actualizan el enfoque terapéutico de los trastornos premenstruales

Análisis de las diversas estrategias terapéuticas para los trastornos premenstruales, como tratamientos no farmacológicos, terapia cognitivo conductual y opciones con drogas.

[Journal of Reproductive Medicine]