

Anticipos SNC

Los artículos de Anticipos han sido escogidos por la dirección médica el día anterior a la culminación de la presente edición.

Aquí sólo adelantamos los resúmenes de sus conclusiones.

Las versiones completas, redactadas por SIIC, integrarán futuros Trabajos Distinguidos en la medida en que sean seleccionadas por el Comité de Expertos de la especialidad.

El tamaño del cáncer mamario predice la probabilidad de metástasis en la axila

En las pacientes con cáncer de mama unifocal existe una correlación positiva y lineal entre el tamaño tumoral y la probabilidad de compromiso de los nodos linfáticos axilares. Esa probabilidad puede estimarse en forma prequirúrgica a partir de una ecuación simple que considera la primera variable.

[ANZ Journal of Surgery]

El hirsutismo se asocia con mayor resistencia a la insulina en el síndrome de ovarios poliquísticos

Las pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos que presentan hirsutismo sin elevación de los valores plasmáticos de andrógenos muestran aumento de la resistencia a la insulina con mayor frecuencia que aquellas sin dicho signo clínico, y este hallazgo es independiente de su peso corporal.

[European Journal of Endocrinology]

Estiman el riesgo de muerte fetal vinculada a la amniocentesis

La realización de amniocentesis durante el segundo trimestre de la gestación, con fines de diagnóstico cromosómico prenatal, se acompaña de riesgo pequeño aunque significativo de muerte fetal (0.86% en el estudio descrito), especialmente cuando tiene lugar luego de las 18 semanas de gestación, cuando es motivada por alteraciones en las pruebas de laboratorio o cuando el líquido amniótico presenta aspecto hemorrágico.

[Prenatal Diagnosis]

Las mujeres muestran mayor culpabilidad y menor autoestima frente a la esterilidad

Los integrantes de parejas estériles utilizan diferentes estrategias de afrontamiento del problema, y es habitual que las mujeres se sientan culpables de la situación, lo que resulta en baja autoestima y mayor grado de angustia.

[West Indian Medical Journal]

El examen clínico tiene baja sensibilidad para reconocer la presentación no cefálica del feto

En comparación con la ecografía, el examen clínico realizado durante los últimos meses de la gestación tiene sensibilidad inadecuada para reconocer la presentación no cefálica del feto, por lo que no permite la toma de decisiones respecto del parto con la debida anticipación.

[BMJ]

La expulsión de un dispositivo intrauterino es factor de riesgo de fracasos futuros

Los investigadores hallaron que el antecedente de expulsión previa de un dispositivo intrauterino y la edad materna inferior a 35 años son factores de predicción de fracaso futuro, mientras que el consumo de fármacos, incluidos los antiinflamatorios, no aumenta el riesgo de embarazo.

[Human Reproduction]

La tibolona podría ser útil para pacientes tratadas por cáncer de endometrio

En pacientes tratadas por cáncer de endometrio el tratamiento con tibolona para el alivio de los síntomas menopásicos no parece afectar la supervivencia general o el tiempo libre de enfermedad.

[Maturitas]

La drospirenona es un nuevo progestágeno con características únicas

En este editorial el autor presenta la drospirenona y realiza un extenso comentario sobre sus ventajas y posibles aplicaciones.

[Climacteric]

Investigan el efecto de la terapia de reemplazo hormonal sobre la morfología cerebral

Según los resultados de este estudio, las mujeres que recibían tratamiento hormonal presentaron signos de mayor atrofia cerebral (evaluada por resonancia magnética nuclear) sin alteración de su desempeño cognitivo.

[Psychiatry Research-Neuroimaging]

Describen las imágenes características del carcinoma de mama tubulolobulillar

Habitualmente, el carcinoma de mama tubulolobulillar se manifiesta clínicamente como una masa firme e inmóvil, isodensa, de bordes indefinidos y sin microcalcificaciones en la mamografía, y como una lesión hipoeocoica, espiculada o microlobulada, que puede poseer un cono de sombra posterior en la ecografía; por lo tanto, la identificación de imágenes con estas características debería alertar al médico acerca de la posibilidad de una neoplasia de este tipo.

[European Journal of Radiology]

Consideraciones para evitar los embarazos múltiples cuando se indujo la ovulación

En los casos de infertilidad en los que se produce inducción de la ovulación, existe un riesgo asociado de embarazo múltiple. Al respecto, la reducción de dicho riesgo comprende el seguimiento de ciertas reglas, como la interrupción del ciclo frente a la presencia de más de tres folículos ováricos.

[ANZJOG]

Identifican brechas en la información científica sobre la mortalidad materna

Las publicaciones acerca de la mortalidad materna que consideran los factores culturales y políticos como determinantes son muy escasas, consisten principalmente en estudios transversales y sus autores provienen de países desarrollados, por lo que se requieren investigaciones adicionales sobre la importancia de las variables macroestructurales para elaborar estrategias sanitarias que reduzcan efectivamente la tasa de mortalidad materna en los países en desarrollo.

[Bulletin of the World Health Organization]