

## Anticipos SNC

Los artículos de Anticipos han sido escogidos por la dirección médica el día anterior a la culminación de la presente edición. Aquí sólo adelantamos los resúmenes de sus conclusiones. Las versiones completas, redactadas por SIIC, integrarán futuros Trabajos Distinguidos en la medida en que sean seleccionadas por el Comité de Expertos de la especialidad.

### La depresión asociada a la perimenopausia y su tratamiento en la atención primaria

La perimenopausia es una transición significativa en la vida de la mujer; en la aparición de depresión durante ese período se halla involucrada una variedad de factores causales psicológicos, genéticos y fisiológicos.

[Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology]

### Amenorrea en la adolescencia y riesgo de osteoporosis en la menopausia

La amenorrea secundaria durante la adolescencia puede cumplir un papel en la aparición de osteoporosis más grave en la menopausia.

[Maturitas]

### Afirman que los estrógenos no protegen contra la enfermedad arterial periférica

Los eventos de obstrucción de carótida, arterias de extremidades inferiores y aorta abdominal no se evitan con el tratamiento con estrógenos equinos conjugados; además, en algunos casos, el riesgo parece incrementarse con la terapia.

[American Heart Journal]

### Mayor frecuencia de lactancia materna en hijos de madres trabajadoras en comparación con las amas de casa

Es necesario intervenir para estimular la aparición de sentimientos positivos relacionados con la lactancia materna. Se debe enfatizar en el empleo materno y la duración de las licencias por maternidad, la experiencia de lactancia inicial y la estación del año en la cual tiene lugar el nacimiento; estos factores intervienen en la aparición de la intención de amamantamiento.

[Acta Paediatrica]

### Frecuencia de fracturas vertebrales en mujeres posmenopáusicas chilenas y su relación con la osteoporosis

De 555 mujeres chilenas posmenopáusicas, el 30% presentó fracturas vertebrales, la mayoría observadas en mujeres sin osteoporosis densitométrica.

[Revista Médica de Chile]

### La eficacia del tratamiento sistémico del cáncer de mama metastásico depende de la adecuada selección de los fármacos

Los taxanos y los antimetabolitos se encuentran entre los agentes más efectivos para el cáncer de mama avanzado debido a metástasis. La biología tumoral en el nivel celular condiciona la eficacia terapéutica: la presencia de receptores específicos augura resultados satisfactorios por efecto del tratamiento hormonal.

[European Journal of Cancer Supplements]

### Valor de la glucemia en ayunas para la detección de tolerancia anormal a la glucosa en mujeres con ovarios poliúísticos

El valor de corte de la glucemia en ayunas de 5.6 o 5.7 mmol/l, actualmente recomendado por las normas estadounidenses y canadienses para la detección de los casos con afección de la tolerancia a la glucosa entre las pacientes con síndrome de ovario poliúístico, se asocia con baja sensibilidad.

[Canadian Medical Association Journal]

### Estudian el efecto de la autoinmunidad y la función tiroidea en el resultado de las técnicas de reproducción asistida

Entre las mujeres sometidas a técnicas de reproducción asistida, la presencia de anticuerpos antiperoxidasa tiroidea no afecta la tasa de embarazos ni la evolución de éstos. Sin embargo, la observación de niveles séricos elevados de tirotrófina previamente a la realización de esa técnica se asocia con mayor riesgo de pérdida del embarazo logrado.

[Journal of Endocrinological Investigation]

### Analizan la asociación entre el consumo de ácido fólico y la aparición de fisuras orofaciales

El consumo de al menos 400 µg/día de ácido fólico durante la primera etapa del embarazo, junto con multivitamínicos y buena dieta, reduciría el riesgo de nacimientos con labio leporino combinado o no con fisura palatina.

[BMJ]

### La enfermedad inflamatoria intestinal se asocia frecuentemente con complicaciones obstétricas

La incidencia de nacimiento pretérmino, de bajo peso al nacer y de cesárea es mayor en mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal. Asimismo, las malformaciones congénitas son más comunes en enfermas con colitis ulcerosa.

[Gut]

### Utilidad de la vacunación para la prevención del cáncer de cuello de útero

La vacuna tetravalente contra el virus del papiloma humano (HPV) disminuye el riesgo de cáncer cervical en las adolescentes que iniciarán su vida sexual y en las mujeres adultas sexualmente activas.

[Journal of Family Practice]

### Detección en la infancia del riesgo de síndrome de ovarios poliúísticos

En esta reseña se analizaron las pruebas que indican que los factores de riesgo para el síndrome de ovarios poliúísticos pueden reconocerse en la infancia.

[Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism]