

## Autoevaluaciones de Lectura

Por cada artículo de las secciones Actualizaciones y Hallazgos se formula una pregunta, con cuatro posibles opciones de respuesta: la afirmación acertada, que surge de la lectura atenta del trabajo, es citada en la página de respuestas, acompañada de una breve fundamentación.

TD Nº	Enunciación	Seleccione su opción
1	¿Cuál de los siguientes moduladores selectivos de los receptores de estrógenos no se metaboliza por el sistema hepático de la citocromo P450?	A) Tamoxifeno. B) Toremifeno. C) Raloxifeno. D) Ninguno se metaboliza por esta vía.
2	Señale la afirmación correcta:	A) Etica médica es sinónimo de moralidad médica. B) La principio de justicia obliga a aplicar un tratamiento sólo al paciente que lo necesita. C) El principio de beneficencia consiste en prestar servicios médicos a desamparados. D) La integridad requiere la práctica de la medicina de acuerdo con los estándares de excelencia.
3	¿Cuál de los siguientes fármacos no debería ser utilizado en diabetes gestacional?	A) Insulina lispro. B) Glibenclamida. C) Tolbutamida. D) Ninguna de ellas.
4	¿Cuál es el efecto de la terapia hormonal sustitutiva (THS) en mujeres posmenopáusicas?	A) Aumento del riesgo de cáncer de mama. B) Aumento del riesgo de eventos tromboembólicos. C) Menor riesgo de cáncer de colon. D) Todos ellos.
5	¿Qué diferencia a las gestaciones gemelares concebidas mediante técnicas de reproducción asistida de las que son producto de la concepción natural?	A) Mayor incidencia de anomalías placentarias B) Menor peso de nacimiento C) Mayor discordancia gemelar D) Menor edad materna
6	¿Cuál es la incidencia de tromboembolia venosa en mujeres con preeclampsia?	A) 0.12%. B) 0.08%. C) 1.5%. D) 0.01%.
7	¿Qué caracteriza a la práctica obstétrica actual?	A) Aumento de la tasa de cesáreas. B) Disminución de las complicaciones asociadas a las cesáreas. C) Incremento en el empleo del fórceps. D) Disminución del número de histerectomías laparoscópicas.
8	Señale la afirmación correcta:	A) La discordancia del peso neonatal en gemelos no es proporcional al riesgo de morbilidad. B) La hipoglucemia fetal se asocia con partos prematuros, especialmente en embarazos gemelares. C) La hipoglucemia neonatal aumenta el riesgo de déficit neurológico. D) Se considera hipoglucemia neonatal una glucemia menor que 20 mg/dl.
9	¿Cuál es el índice de sobrevida a los 5 años en pacientes operadas por carcinoma de vulva en Zaragoza?	A) 64.7%. B) 95.3%. C) 18.9%. D) 73.2%.
10	¿Cuál de los siguientes factores se asocia con menor densidad mamaria?	A) Índice de masa corporal bajo. B) Mujeres nulíparas. C) Tabaquismo. D) Ninguno de ellos.
11	¿Qué efecto parece tener la terapia hormonal de reemplazo por vía transdérmica sobre la hipertensión?	A) La empeora notablemente. B) Aumenta la necesidad de medicación. C) Depende de la edad de las enfermas. D) No ejerce ningún efecto desfavorable.
12	¿Cuál de las siguientes modalidades de terapia adyuvante parece más eficaz en el tratamiento de mujeres premenopáusicas con cáncer de mama en estadio I y II?	A) Quimioterapia. B) Tamoxifeno y goserelina. C) Radioterapia. D) Ninguna es útil en mujeres premenopáusicas.
13	¿Qué efecto tiene la terapia hormonal de reemplazo con estrógenos y progesterona sobre el metabolismo de la glucemia en mujeres con enfermedad coronaria?	A) Aumento considerable del riesgo de presentar diabetes. B) Aumento leve del riesgo. C) Reducción del riesgo del 35%. D) El efecto depende de la edad de las enfermas.
14	¿En qué situación la fertiloscopia no debe ser el método diagnóstico de elección en caso de infertilidad?	A) En enfermedades pelvianas. B) En adherencias periováricas sutiles. C) En endometriosis. D) En obstrucciones tubarias.
15	¿En qué tipo de pacientes es más frecuente la incontinencia urinaria de urgencia posterior al procedimiento de banda vaginal sin tensión?	A) Obesas. B) Ancianas. C) Con sobrepeso. D) Con peso normal.

## Autoevaluaciones de Lectura

### Respuestas Correctas

TD N°	Respuestas	Fundamentación	Clave
1	Raloxifeno.	El tamoxifeno y el toremifeno son metabolizados por el sistema de la CYP mientras que el raloxifeno sufre metabolismo por glucuroniltransferasas.	C
2	La integridad requiere la práctica de la medicina de acuerdo con los estándares de excelencia.	Para ello se necesita rigor en la formación del juicio clínico, que deberá basarse en la mejor información científica disponible.	D
3	Tolbutamida.	Ciertas sulfonilureas son capaces de atravesar la placenta y ser teratogénicas.	C
4	Todos ellos.	Estos son algunos de los efectos confirmados, en relación con el uso de la THS, a partir de numerosas investigaciones.	D
5	Menor peso de nacimiento	El peso de nacimiento de los gemelos concebidos mediante técnicas de reproducción asistida es inferior al de los neonatos producto de la concepción natural.	B
6	0.12%.	El 0.12% de las mujeres con preeclampsia puede desarrollar en el futuro eventos de tromboembolia venosa.	A
7	Aumento de la tasa de cesáreas.	La práctica obstétrica actual se caracteriza por la mayor tasa de cesáreas.	A
8	La hipoglucemia neonatal aumenta el riesgo de déficit neurológico.	La hipoglucemia neonatal aumenta el riesgo de alteración de las funciones neurofisiológicas y el desarrollo nervioso. Se manifiesta clínicamente como temblores, irritabilidad, apnea o convulsiones, y se la define generalmente como una concentración de glucosa sanguínea inferior a 40 mg/dl.	C
9	64.7%..	La sobrevivida estimada libre de enfermedad a los 5 años y a los 10 años es del 64.7% y del 61.2%, respectivamente.	A
10	Tabaquismo.	El fenómeno obedecería a la supresión de estradiol en mujeres que fuman.	C
11	No ejerce ningún efecto desfavorable.	La terapia hormonal de reemplazo por vía transdérmica no parece ejercer efecto deletéreo alguno sobre el control de la hipertensión en mujeres posmenopáusicas hipertensas.	D
12	Tamoxifeno y goserelina.	La combinación de goserelina y tamoxifeno parece más eficaz que la quimioterapia en el tratamiento adyuvante de cáncer de mama en mujeres premenopáusicas.	B
13	Reducción del riesgo del 35%.	En mujeres con enfermedad coronaria, la terapia hormonal de reemplazo reduce la incidencia de diabetes en 35% pero la información aún no es suficiente como para indicar tratamiento hormonal en la prevención secundaria cardiovascular.	C
14	En enfermedades pelvianas.	En caso de enfermedad pelviana debe realizarse laparoscopia, ya que brinda la posibilidad de realizar tratamiento quirúrgico.	A
15	Obesas.	En pacientes obesas es más frecuente la incontinencia urinaria de urgencia posterior al procedimiento de banda vaginal sin tensión.	A