

Autoevaluaciones de Lectura

Por cada artículo de las secciones Reseñas y Novedades distinguidas se formula una pregunta, con cuatro opciones de respuesta. La afirmación acertada, que surge de la lectura atenta del trabajo, es citada en la página Respuestas Correctas, acompañada de una breve fundamentación.

TD N°	Enunciación	Seleccione su opción
1	¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de la infertilidad en la orquitis urliana?	A) El mecanismo fisiopatológico se desconoce. B) Se producen anticuerpos contra los tubos seminíferos. C) Activación de los linfocitos T citotóxicos que se vuelven contra la rete testis. D) Existe citotoxicidad directa del virus contra los espermatozoides.
2	¿Qué antibióticos han demostrado resistencia intermedia en diferentes cepas de <i>Neisseria meningitidis</i> para realizar quimioprofilaxis?	A) Ofloxacina y sulbactam. B) Minociclina y ampicilina. C) Penicilina y ampicilina. D) Ciprofloxacina y ácido clavulánico.
3	¿Cuál de los siguientes no es un criterio mayor para definir neumonía adquirida en la comunidad grave?	A) Necesidad de ventilación mecánica. B) Shock séptico. C) Insuficiencia renal aguda. D) Neumonía multilobar o bilateral.
4	¿Qué virus de hepatitis puede ocasionar infección intrauterina?	A) Virus C. B) Virus B. C) Virus G. D) Virus A.
5	El metapneumovirus humano:	A) Provoca amplio espectro de patologías a nivel respiratorio. B) Pertenece a la familia Orthomyxoviridae. C) Es indistinguible del coronavirus asociado al SARS. D) Afecta a lactantes y ancianos.
6	En relación con la neumonía neumocócica resistente a penicilina y el tratamiento antibiótico:	A) Los receptores de trasplantes fueron los únicos factores de riesgo. B) Sólo 15% de los aislamientos neumocócicos fueron sensibles a la penicilina. C) Los betalactámicos, incluida la penicilina, resultan un tratamiento efectivo. D) El tratamiento antibiótico discordante se asoció con mayor tasa de mortalidad.
7	El síndrome urémico hemolítico se define por:	A) Anemia hemolítica. B) Insuficiencia renal. C) Trombocitopenia. D) Todos los anteriores.
8	¿La vaginosis bacteriana se asocia con mayor riesgo de aborto en qué trimestre del embarazo?	A) Primer trimestre. B) Segundo trimestre. C) Tercer trimestre. D) No se asocia con aborto.
9	¿Qué manifestaciones son comunes en mujeres con malaria grave por <i>Plasmodium falciparum</i> ?	A) Hipoglucemia. B) Anemia. C) Edema de pulmón. D) Todas.
10	¿Cuál de las siguientes variables predice en forma significativa la aparición de enfermedad renal crónica en sujetos infectados por el HIV?	A) Edad avanzada. B) Diabetes. C) Hipertensión. D) Raza negra.
11	¿Qué medida deben tener las vegetaciones para presentar mayor riesgo de embolias?	A) Más de 5 mm. B) Más de 7 mm. C) Más de 10 mm. D) Más de 12 mm.
12	¿Qué antibiótico se debe indicar a una mujer que está cursando el tercer trimestre de embarazo y que presenta bacteriuria asintomática?	A) Nitrofurantoína. B) Fluoroquinolonas. C) Sulfonamidas. D) No requiere tratamiento.
13	¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el uso de antibióticos en la práctica ambulatoria y las infecciones estreplocócicas?	A) Los estreptococos resistentes a macrólidos fueron más frecuentes en Escandinavia. B) La prevalencia de neumococos no sensibles a penicilina no varió entre los países. C) La presión selectiva por el uso inapropiado puede ser un factor de resistencia. D) No hay relación entre el consumo de antibióticos y la prevalencia de neumococos.