

Autoevaluaciones de Lectura

Respuestas Correctas

TD Nº	Respuestas	Fundamentación	Clave
1	El mecanismo fisiopatogénico se desconoce.	Los mecanismos exactos del compromiso de la fertilidad no han sido totalmente comprendidos, especialmente la participación de los anticuerpos contra los espermatozoides.	A
2	Penicilina y ampicilina.	Un estudio comparativo realizado en España sobre los perfiles de sensibilidad de cepas aisladas de pacientes con enfermedad meningocócica invasiva y de portadores rinofaríngeos demostró alto porcentaje de cepas con resistencia intermedia a penicilina y ampicilina.	C
3	Neumonía multilobar o bilateral.	La neumonía multilobar o bilateral es un criterio menor para definir neumonía adquirida en la comunidad como grave.	D
4	Virus B.	Este virus es el único que puede infectar células germinales y por ende ocasionar infección intrauterina.	B
5	Provoca amplio espectro de patologías a nivel respiratorio.	Las infecciones que causa se han encontrado en todos los grupos etarios y con un espectro amplio de compromiso del aparato respiratorio, incluido un síndrome similar a la influenza, bronquitis, bronquiolitis y neumonitis.	A
6	Los betalactámicos, incluida la penicilina, resultan un tratamiento efectivo.	Los puntos de corte de la NCCLS para <i>S. pneumoniae</i> no predijeron resultados clínicos. Aunque la resistencia <i>in vitro</i> está en aumento, parecería que este incremento todavía no es clínicamente relevante.	C
7	Todos los anteriores.	La experiencia clínica con la patología a partir de su detección permite definirla por medio de la presentación de todos los signos mencionados.	D
8	Segundo trimestre.	La vaginosis bacteriana detectada tempranamente en el embarazo no parece favorecer los nacimientos prematuros, pero se asocia con mayor riesgo de aborto en el segundo trimestre del embarazo.	B
9	Todas.	Las mujeres embarazadas con malaria grave son más vulnerables a presentar hipoglucemia, edema de pulmón y anemia.	D
10	Edad avanzada.	En el modelo de múltiples variables, sólo la edad en el momento del diagnóstico de infección se asocia en forma significativa con patología renal crónica.	A
11	Más de 10 mm.	El riesgo de embolias fue del 57% si las vegetaciones eran mayores de 10 mm y de 22% cuando tuvieron menor tamaño.	C
12	Nitrofurantoína.	Se debe tratar a las embarazadas con bacteriuria asintomática por el riesgo de que presenten cistitis o pielonefritis. Las fluoroquinolonas no se indican en las embarazadas y no se deben administrar sulfonamidas durante el tercer trimestre de embarazo, por riesgo de kernicterus.	A
13	La presión selectiva por el uso inapropiado puede ser un factor de resistencia.	El uso de antibióticos ejerce presión selectiva sobre la resistencia en patógenos respiratorios mediante diversas vías. Cualquier tipo de tratamiento reciente puede seleccionar neumococos resistentes a través de la inhibición de la flora comensal sensible y de la erradicación de las cepas sensibles.	C