

Autoevaluaciones de Lectura

Por cada artículo de las secciones Artículos Originales, Reseñas distinguidas y Novedades distinguidas se formula una pregunta, con cuatro opciones de respuesta. La afirmación acertada, que surge de la lectura atenta del trabajo, es citada en la página Respuestas Correctas, acompañada de una breve fundamentación.

Nº	Enunciación	Seleccione su opción
1	¿Cuál de los siguientes inhibidores de la fosfodiesterasa 5 tiene duración de acción más prolongada?	A) Sildenafil. B) Tadalafil. C) Vardenafil. D) Todos tienen similar duración de acción.
2	¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de la infertilidad en la orquitis urliana?	A) El mecanismo fisiopatológico se desconoce. B) Se producen anticuerpos contra los tubos seminíferos que los lesionan de manera irreversible. C) Se desencadena una activación de los linfocitos T citotóxicos que se vuelven contra la rete testis. D) Existe citotoxicidad directa del virus contra los espermatozoides.
3	¿Qué porcentaje de parejas acepta el asesoramiento rutinario antes del tratamiento de fertilización asistida, según los resultados de un estudio de Suiza?	A) 14% B) 25% C) 33% D) 79%
4	¿Qué patologías se relacionan con compuestos químicos hormonalmente activos?	A) Neoplasia testicular. B) Criptorquidia. C) Disminución en el recuento espermático. D) Todas son correctas.
5	¿Qué parámetro de la actividad sexual se altera en presencia de síntomas del tracto urinario inferior?	A) Erección. B) Eyaculación. C) Satisfacción. D) Todos.
6	¿Cuál es el umbral de antígeno prostático específico que se asocia con pronóstico más desfavorable en pacientes con cáncer de próstata localizado?	A) 20 ng/ml. B) 10 ng/ml. C) 15 ng/ml. D) 5 ng/ml.
7	¿Qué hallazgos se encuentran en hombres infértiles con varicocele?	A) Mayor concentración de especies reactivas de oxígeno. B) Menor capacidad antioxidante total. C) Mayor producción de óxido nítrico. D) Todos ellos.
8	¿Cuál es la eficacia del tratamiento antibiótico con ciprofloxacina durante 3 días en mujeres con infección urinaria no complicada?	A) Inferior a la que se observa con la terapia de 7 días. B) Similar a la que se obtiene con el tratamiento más largo. C) Superior a la de la terapia de 7 días. D) El tratamiento de 3 días no es apto para estas enfermas.
9	¿En qué órgano es mayor la incidencia de linfedema asociado a neoplasia urológica?	A) Testículo. B) Próstata. C) Vejiga. D) Pene.
10	¿Cuál parámetro permite el control de los pacientes tratados con testosterona?	A) Hematocrito. B) Testosterona libre. C) 5 α -dihidrotestosterona. D) 17 β -estradiol.
11	¿Cuál es la posología de ciprofloxacina oral LP recomendada para la ITU no complicada?	A) 500 mg / 24 hs durante 3 días. B) 1000 mg/ 24 hs durante 5 días. C) 1500 mg / 24 hs durante 7 días. D) 500 mg/ 24 hs única dosis.
12	¿Cuál parámetro experimenta mejoría sostenida en pacientes con hipogonadismo y disfunción eréctil tratados con testosterona?	A) Función eréctil. B) Líbido. C) Satisfacción con el tratamiento. D) Función orgásmica.
13	¿Cuál efecto adverso asociado con el tratamiento del cáncer de próstata no metastásico incide en la decisión de someterse a él?	A) Pérdida de energía. B) Ginecomastia. C) Pérdida de la libido. D) Diarrea.
14	¿Qué porcentaje de pacientes recibe información sobre cáncer testicular por parte de profesionales de atención primaria?	A) 2.5% B) 15% C) 25% D) 10%
15	¿Dentro del grupo de hombres con disfunción eréctil, qué porcentaje tiene riesgo para enfermedad vascular periférica?	A) 50% B) 35% C) 75% D) 40%
16	¿Cuál es el factor de riesgo ambiental primario para el cáncer de vejiga?	A) Tabaquismo B) Anilinas C) Industria del cuero D) Derivados del caucho
17	¿Cómo actúan sobre el metabolismo óseo los bisfosfonatos?	A) Inhiben la resorción ósea. B) Estimulan la resorción ósea. C) Aumentan el número de osteoblastos. D) Disminuyen el número de osteoblastos.
18	¿En qué pacientes es más útil la determinación de la fracción de antígeno prostático (PSA) libre?	A) En sujetos con PSA por debajo de 3 ng/ml. B) En enfermos con PSA inferior a 4 ng/ml. C) En pacientes con PSA por encima de 20 ng/ml. D) En hombres con PSA entre 4.1 y 10 ng/ml.
19	Tras el primer ciclo de supresión androgénica intermitente ¿cuántos casos de cáncer de próstata metastásico alcanzan niveles de antígeno prostático específico menores de 20 ng/ml?	A) 45% B) 33% C) 76% D) 55%