



Volumen 2, Número 2, Junio 2004

● Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

FACTORES PREDICTIVOS DE ASMA

D. Patrón obstructivo en la espirometría e hiperreactividad bronquial.

Fundamentación: Los factores predictivos positivos independientes más importantes para la presencia de síntomas de asma en la adultez fueron la presencia de un patrón obstructivo en la espirometría e hiperreactividad bronquial en la niñez.

DESCRIBEN LA PRODUCCION DE UN MODULADOR INDUCIDO POR LOS GLUCOCORTICOIDES Y LA INTERLEUQUINA 10

A. Inhiben los macrófagos.

Fundamentación: La experiencia acumulada permite aseverar el concepto.

IMPACTO PSICOLOGICO DE LAS PATOLOGIAS DE PIEL

D. Todos ellos.

Fundamentación: Estas patologías, además de fobia social, son las alteraciones psicológicas y psiquiátricas más comunes en pacientes con acné, psoriasis y dermatitis atópica, entre otras afecciones cutáneas.

Trabajos Distinguidos, Serie Alergia e Inmunología, integra el Programa SIIC-Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC) de Educación Médica Continua