



Volumen 2, Número 6, Junio 2005

● Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

PROPIONATO DE FLUTICASONA A DEMANDA EN RINITIS ALERGICA ESTACIONAL

B. Puede utilizarse a demanda.

Fundamentación: En rinitis leve, el propionato de fluticasona aplicado según necesidad alivia los síntomas y mejora sustancialmente la calidad de vida.

FLUTICASONA EN LA RINITIS PERENNE NO ALERGICA

D. En todos los casos.

Fundamentación: El propionato de fluticasona, además de ser útil en la rinitis alérgica, es eficaz en pacientes con rinitis no alérgica con eosinofilia o sin ella.

EL INTERFERON ALFA CON-1 PUEDE PRODUCIR PURPURA TROMBOCITOPENICA AUTOINMUNE

A. 0.2%.

Fundamentación: La incidencia de púrpura trombocitopénica autoinmune en pacientes con hepatitis C crónica asciende al 0.2%.

INCREMENTO DE LA MORTALIDAD EN PACIENTES CON COINFECCION POR HIV Y VHC EN LA EPOCA DE LA TERAPIA ANTIRETROVIRAL DE GRAN ACTIVIDAD

D. La coinfección por VHC provoca una disminución significativa de la supervivencia en pacientes infectados por HIV.

Fundamentación: Los pacientes coinfectados presentaron duraciones más cortas de su supervivencia desde la fecha del diagnóstico de la infección por HIV y desde el diagnóstico de sida.

Trabajos Distinguidos, Serie Alergia e Inmunología, integra el Programa SIIC de Educación Médica Continuada