

---

## ● Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

---

### UTILIDAD DE LA PRUEBA DEL FOTOPARCHÉ EN LA EVALUACIÓN DE LAS REACCIONES DE FOTOSENSIBILIDAD

D. Alrededor del 5%.

**Fundamentación:** Se estima que alrededor de un 5% de los pacientes con dermatitis tiene una reacción fotoalérgica; la alergia de contacto es levemente más común.

---

### CONTINÚA LA CONTROVERSI A PARA LA RELACIÓN ENTRE OBESIDAD Y ASMA

D. Todos ellos.

**Fundamentación:** Diversos estudios clínicos y epidemiológicos sugieren una asociación entre el asma y la obesidad. Aunque los resultados por ahora no son concluyentes, éstos son algunos de los factores que podrían intervenir en dicha asociación.

---

### MÚLTIPLES VENTAJAS DEL EMPLEO DE UN UNICO INHALADOR COMO TERAPIA DE MANTENIMIENTO Y DE RESCATE EN ASMA

C. Formoterol más budesonida.

**Fundamentación:** Debido a que el formoterol (agonista beta 2 de acción prolongada) tiene un rápido inicio de acción, su combinación con fluticasona representa una excelente opción como terapia de mantenimiento y de rescate en pacientes con asma.

---

### EL TABAQUISMO ES EL PRIMER FACTOR DE RIESGO PARA LA EPOC

D. Todos ellos.

**Fundamentación:** Aunque ninguna de estas evaluaciones es completamente satisfactoria, permiten identificar bastante bien la enfermedad de la pequeña vía aérea, especialmente comprometida en pacientes fumadores con enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

## LOS VALORES DE LA ESPIROMETRÍA CON UN APARATO PARA USO DOMÉSTICO SE CORRELACIONAN POCO CON OTROS INDICES DE ACTIVIDAD EN ASMA

**D.** Las variaciones en el pico de flujo y el volumen espiratorio forzado en un segundo se correlacionan poco con otros marcadores de actividad.

**Fundamentación:** Las variaciones en el pico de flujo y en el volumen espiratorio forzado en el primer segundo, registradas con un espirómetro portátil en el hogar, muestran poca correlación con otros marcadores de actividad en niños con asma, un fenómeno que complica el uso de estos equipos para el monitoreo de la enfermedad.

---

## LOS ANTIHISTAMÍNICOS DE SEGUNDA GENERACIÓN SON EXCELENTES ALTERNATIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA RINITIS ALÉRGICA

**A.** Cetirizina

**Fundamentación:** La cetirizina es el único antihistamínico de segunda generación que puede inducir un efecto sedante, incluso cuando se lo utiliza en las dosis recomendadas.

---

## MÍNIMOS EFECTOS DEL PROPIONATO DE FLUTICASONA SOBRE LA FUNCIÓN ADRENAL

**D.** Seiscientos µg

**Fundamentación:** Una revisión reciente revela que el propionato de fluticasona en las dosis habituales de 50 µg a 500 µg por día no suprime la función adrenal.

---