Sociedad Iberoamericana de Información Científica
Colección Trabajos Distinguidos Serie Alergia e Inmunología
AAAeIC Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica
Volumen 4, Número 4, Noviembre 2007

Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

LA COLONIZACIÓN POR *HELICOBACTER PYLORI* DURANTE LA NIÑEZ PROTEGE CONTRA LA APARICIÓN DE ASMA Y ALERGIA

C. La infección reduce el riesgo de presentar asma.

Fundamentación: La adquisición temprana de *Helicobacter pylori*, sobre todo de cepas *CagA* positivas, reduce el riesgo de aparición de asma y de rinitis alérgica.

USO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA Y ALTERNATIVA EN NIÑOS CON ASMA

B. Más del 60%.

Fundamentación: El 65% de los padres informó el uso de medicina complementaria y alternativa para tratar los síntomas de asma de sus hijos.

EL INDACATEROL ES UN NUEVO BRONCODILATADOR DE ACCIÓN PROLONGADA CON UNA ELEVADA EFICACIA INTRÍNSECA

D. Todas ellas.

Fundamentación: En virtud de su rápido comienzo de acción, de la eficacia intrínseca elevada y de su acción prolongada, el indacaterol podría representar una nueva opción en el tratamiento del asma.

LA EVALUACIÓN DEL CONDENSADO DE AIRE EXHALADO PERMITIRÁ TRATAR MÁS ESPECÍFICAMENTE A LOS PACIENTES ASMÁTICOS

.

Fundamentación: Para optimizar las estrategias terapéuticas se intenta identificar las causas subyacentes de asma. Se evaluó el condensado de aire exhalado mediante señales obtenidas por resonancia magnética nuclear (RMN) y se identificaron patrones espectroscópicos para diferenciar a los pacientes con asma clínicamente identificada de los sujetos sanos. Los patrones obtenidos mediante RMN del condensado de aire exhalado pueden servir para diferenciar fenotipos y comprender los disturbios bioquímicos de la vía aérea que subyacen a la disfunción celular. Es decir, pueden ser de utilidad para identificar el disturbio que ocasiona síntomas asmáticos en un determinado paciente.

SEGURIDAD DEL JARABE DE DESLORATADINA EN PACIENTES MENORES DE 2 AÑOS

B. Entre 10% y 30%.

Fundamentación: Durante la administración de desloratadina a pacientes menores de 2 años, la frecuencia de aparición de efectos adversos relacionados con la terapia es de aproximadamente el 26%.