



Volumen 12, Número 3, Enero 2004

Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

COMPARAN LA EVOLUCION CARDIOVASCULAR CON DISTINTOS ESQUEMAS ANTIHIPERTENSIVOS

D. Todos por igual.

Fundamentación: No se registraron diferencias importantes entre los pacientes tratados con estos esquemas.

TERAPIA CON AMIODARONA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA DESCOMPENSADA

C. Amiodarona hasta la recuperación de la clase funcional y luego pasaje a betabloqueantes.

Fundamentación: La amiodarona parece una terapia eficaz en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada que no pueden recibir betabloqueantes y podría facilitar el tratamiento posterior con estos fármacos.

EL SIMVASTATIN PROLONGA EL EJERCICIO SIN CLAUDICACION INTERMITENTE EN ANCIANOS CON ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFERICA

A. 24%.

Fundamentación: La terapia con simvastatín durante 6 meses aumenta en un 24% la capacidad de ejercicio en ancianos con enfermedad arterial periférica.

Trabajos Distinguidos, Serie Cardiología,
integra el Programa SIIC de Educación Médica Continuada