



Volumen 13, Número 3, Enero 2005

---

## ● **Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas**

---

### **ANALIZAN LA EFICACIA DEL TADALAFILO EN LA HIPERTENSION PULMONAR PRIMARIA**

**B.** Puede administrarse una vez por día e incluso en días alternos.

**Fundamentación:** En virtud de que la vida media del tadalafilo es casi 5 veces más larga que la del sildenafil, el primero puede administrarse una vez al día e incluso día por medio, situación que lo torna ampliamente ventajoso para el tratamiento de pacientes con HPP.

---

### **INFLUENCIA DE LAS TRANSFUSIONES EN PACIENTES CON SINDROMES CORONARIOS AGUDOS**

**C.** Se asocia con mayor riesgo de mortalidad a los 30 días.

**Fundamentación:** Las transfusiones, en el contexto de síndromes coronarios agudos, parecen asociarse con mayor mortalidad aún después del ajuste según otros factores que influyen en la evolución.

---

### **COMPROMISO DEL CORAZON EN EL HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO**

**A.** Disfunción sistólica.

**Fundamentación:** La función sistólica en pacientes con hiperparatiroidismo primario no parece estar particularmente afectada.

---

### **LOS PACIENTES CON FIBRILACION AURICULAR RECIBEN FARMACOS ANTIARRITMICOS A PESAR DE LAS CONTRAINDICACIONES O ADVERTENCIAS PARA SU USO**

**D.** Flecainida.

**Fundamentación:** Las tres drogas restantes, si bien son utilizadas ampliamente, no se hallan oficialmente aprobadas para el tratamiento de arritmias supraventriculares en Canadá.

---

Trabajos Distinguidos, Cardiología , integra el Programa SIIC de Educación Médica Continuada