



Volumen 3, Número 4, Mayo 2006

Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

ALGUNOS AINE PUEDEN OCASIONAR DEFECTOS EN LA FIJACION DE LAS ENDOPROTESIS PARA ARTROPLASTIAS DE CADERA

A. Prostaglandinas.

Fundamentación: El mecanismo de acción del ibuprofeno y otros AINE sobre la formación de hueso es muy probablemente a través de sus efectos sobre la prostaglandina E2 y otras prostaglandinas, ya que estas sustancias tienen mucha influencia en la osteogénesis y la remodelación ósea.

BIOPSIA DEL GANGLIO CENTINELA CON RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA EN CARCINOMAS MAMARIOS

B. Estadios clínicos con T1 N0 Mx o T2 N0 Mx en pacientes operables.

Fundamentación: La radioterapia intraoperatoria se indica en casos en los que es posible realizar cirugía conservadora, para lo cual el tumor debe ser pequeño para que alcance con cuadrantectomía y, desde luego, no deben observarse metástasis distantes o en territorios ganglionares fuera de la axila homolateral.

ALGUNAS CONSIDERACIONES FISIOPATOLOGICAS SOBRE EL CANCER GASTRICO

A. Limitada por la difusión crónica y por la perfusión aguda.

Fundamentación: En la actualidad se considera que existen 2 tipos principales de hipoxia tumoral: limitada por la difusión crónica y por la perfusión aguda. La primera aparece porque las células están alejadas de los capilares nutrientes como para difundir el oxígeno. En la hipoxia intermitente/aguda, las células permanecen hipóxicas durante un lapso variable.

TERAPIA DEL CANCER COLORRECTAL CON DROGAS DIRIGIDAS A DIFERENTES BLANCOS

B. Inhibidores de la tirosinquinasa, anticuerpos para el factor de crecimiento epidérmico y anticuerpo para el factor de crecimiento vascular endotelial.

Fundamentación: Los inhibidores de la tirosinquinasa, los anticuerpos para el factor de crecimiento epidérmico y el anticuerpo para el factor de crecimiento vascular endotelial son agentes bloqueantes específicos de algunas funciones de las células neoplásicas que, al asociarse con las drogas quimioterápicas antineoplásicas, actuarían en forma sinérgica con ellas y mejorarían los resultados que se obtienen cuando estas últimas se suministran en forma exclusiva.

EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MIEMBROS SUPERIORES EN MUJERES CON CANCER DE MAMA

C. El tratamiento del lado dominante se asocia a un mejor FMS objetivo, pero disminuye el FMS subjetivo.

Fundamentación: Si bien las mujeres tratadas del lado dominante pueden tener más fuerza y resistencia de los miembros superiores y mayor fuerza de prensión manual, el tratamiento en el lado dominante provoca potencialmente una mayor interrupción en sus vidas y se percibe con más molestia.

LA DETECCIÓN DE VIREMIA POR VHC EN DONANTES CAMBIARA LA EVOLUCION DE LOS TRASPLANTES

A. Detección del ARN del VHC.

Fundamentación: La determinación del ARN del VHC tiene una especificidad superior al 95%.
