
● Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

EL DIVERTÍCULO DE MECKEL PUEDE CAUSAR HEMORRAGIA DIGESTIVA GRAVE

C. Íleon.

Fundamentación: El divertículo de Meckel se encuentra en el íleon, implantado en su cara antimesentérica a una distancia aproximada de 60 cm de la unión ileocecal.

DETERMINAN FACTORES PRONÓSTICOS EN TUMORES GASTROINTESTINALES DEL ESTROMA

C. El tamaño del tumor.

Fundamentación: En pacientes con tumores gastrointestinales del estroma del estómago, el tamaño del tumor es el único parámetro con valor predictivo independiente de evolución.

EL EMBARAZO ECTÓPICO NO COMPLICADO NO NECESARIAMENTE DEBE OPERARSE

D. Salpingectomía por laparoscopia o laparotomía.

Fundamentación: La presencia de sangre en la cantidad que se menciona en el enunciado hace presumir ruptura tubaria, por lo cual la conducta apropiada para este embarazo ectópico complicado es la salpingectomía.

LA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE REJUVENECIMIENTO FRONTAL LOGRA BUENOS RESULTADOS

B. Parálisis troncular del nervio facial.

Fundamentación: Si bien es posible la lesión de algunas ramas del nervio facial, en especial las temporofaciales, el tronco del nervio emerge de la base del cráneo muy por debajo y atrás de la zona operatoria, por lo tanto no debe esperarse una parálisis facial de este tipo.

LA SELECCIÓN DE PACIENTES PERMITE ELEGIR EL MEJOR TRATAMIENTO DE LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA

A. Ultrasonografía con compresión.

Fundamentación: La ecografía o mejor aún el eco Doppler color permiten detectar áreas venosas que no disminuyen el calibre por efecto de la compresión. Este signo permite inferir trombosis.

MAYOR FRECUENCIA DE SEROMAS EN PACIENTES OBESOS QUE SE SOMETEN A ABDOMINOPLASTIA Y LIPOSUCCIÓN

D. Dispositivos ultrasónicos.

Fundamentación: Para llevar a cabo la liposucción de la grasa subcutánea, además de la liposucción convencional pueden emplearse dispositivos ultrasónicos.
