



Volumen 4, Número 2, Mayo 2007

---

## ● Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

---

### EN CANCERES PROSTATICOS INICIALES EL TRATAMIENTO TEMPRANO EN HOMBRES DE EDAD AVANZADA AVENTAJA A LA SIMPLE OBSERVACION

B. Prostatectomía radical.

**Fundamentación:** Entre los tratamientos oncológicos para el cáncer de próstata circunscripto, se encuentran la radioterapia externa, la braquiterapia intersticial de baja tasa de dosis, la braquiterapia de alta tasa de dosis y la prostatectomía radical. La lobectomía es una operación que no tiene indicación en cáncer y el vaciamiento lumboaórtico se emplea, entre otras neoplasias, en los carcinomas germinales no seminomatosos de testículo, pero no en los carcinomas de la próstata.

---

### BUENOS RESULTADOS DE UNA TECNICA DE CORRECCION DEL PROLAPSO UTEROVAGINAL EN MUJERES JOVENES

D. Por medio de una malla de polipropileno fijada a la pared posterior del útero y al ligamento longitudinal anterior, entre S1 y S3.

**Fundamentación:** La técnica descrita utilizó una malla de polipropileno suturada a la pared posterior del útero y luego fijada por debajo del peritoneo al ligamento longitudinal anterior, entre S1 y S3, según las características de la pelvis.

---

### NUEVOS COMPUESTOS RADIATIVOS MEJORAN IMAGENES POR TOMOGRAFIA POR EMISION DE POSITRONES EN TUMORES NEUROENDOCRINOS

C. Carcinoide.

**Fundamentación:** Los carcinoides son los únicos de los mencionados que pueden originarse en células del sistema APUD de la mucosa bronquial. Adoptan dos variedades, los típicos y los atípicos, estos últimos capaces de producir metástasis en los ganglios hiliares y mediastinales. Es muy infrecuente que se manifiesten por síndrome carcinoide. En lugar de ello, el cuadro clínico, cuando está presente, se integra con hemoptisis e infecciones reiteradas en el parénquima tributario del bronquio enfermo que, al estar obstruido, permite la acumulación de secreciones que se infectan. Son de lento crecimiento y se tratan mediante resecciones pulmonares típicas, y ocasionalmente por broncotomía y exéresis del tumor con márgenes suficientes.

---

## LA PANCREATITIS ES UNA COMPLICACION RARA Y HABITUALMENTE LEVE EN PACIENTES TRATADOS CON ESTATINAS

C. Suele ser leve y puede aparecer en cualquier momento de la terapia.

**Fundamentación:** La pancreatitis que aparece en pacientes tratados con estatinas por lo general es leve, no está relacionada con la dosis y puede aparecer meses o años después de iniciado el tratamiento.

---

## CONSECUENCIAS DE LA EPIDEMIA DE OBESIDAD Y OBSTACULOS PARA SU CONTROL

D. Todas ellas.

**Fundamentación:** La obesidad aumenta el riesgo de varios trastornos: riesgo muy incrementado (riesgo relativo [RR] > 3) de diabetes, hipertensión, dislipidemia, disnea, apnea del sueño, enfermedad vesicular y riesgo moderadamente aumentado (RR: 2 a 3) de enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca, artrosis de rodilla, hiperuricemia y preeclampsia.

---

## EFFECTIVIDAD DE LA PSICOPROFILAXIS QUIRURGICA DE LOS NIÑOS Y SUS PADRES

C. Estudios controlados aleatorizados a simple ciego.

**Fundamentación:** Existe información experimental obtenida mediante un ensayo clínico controlado, aleatorizado y a simple ciego que apoya la efectividad del uso del juego terapéutico como intervención y la importancia de la participación de los padres en la psicoprofilaxis quirúrgica de los niños.

---

## A PESAR DE LOS AVANCES EN LA TECNOLOGIA MEDICA LOS CARCINOIDES GASTROINTESTINALES NO SE DIAGNOSTICAN TEMPRANAMENTE

C. De Von Hippel Lindau.

**Fundamentación:** Tanto el síndrome de malabsorción como el celíaco se refieren al aparato digestivo, pero no cuentan entre sus integrantes con un carcinóide. El síndrome de Kartagener no es digestivo. Consiste en sinusitis, bronquiectasias y dextrocardia.

---