



Volumen 4, Número 3, Agosto 2007

● Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

ESTUDIO DE LOS FACTORES RELACIONADOS CON LA PREPARACIÓN PURGANTE QUE AFECTAN EL ÉXITO DE LA COLONOSCOPIA

D. El uso de fosfato de sodio

Fundamentación: El empleo de fosfato de sodio en la preparación de los pacientes sometidos a colonoscopia, además de la adhesión adecuada a las instrucciones recibidas con respecto al proceso, representan los factores más importantes en el pronóstico del éxito de la colonoscopia.

UTILIZACIÓN DEL STENT EN TRATAMIENTO DE ANEURISMAS ARTERIALES INFECTADOS

C. Seis semanas.

Fundamentación: El criterio consiste en tratar a los pacientes con antibióticos por vía endovenosa durante por lo menos 6 semanas luego del procedimiento. El tratamiento supresivo por vía oral debe evaluarse caso por caso de acuerdo con los parámetros de infección clínicos y de laboratorio.

DIFERENTES FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS CON PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA EN VASOS GRANDES Y PEQUEÑOS

D. Todas son correctas.

Fundamentación: En un estudio longitudinal en pacientes vasculares se confirmó el papel del tabaquismo activo y de la relación colesterol total/colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad en la progresión de la enfermedad arterial periférica de vasos grandes y se aportaron nuevos datos respecto de la importancia de la lipoproteína(a) y la proteína C reactiva de alta sensibilidad como nuevos marcadores de progresión de la enfermedad arterial periférica de vasos grandes.

EVALÚAN LA QUIMIORRADIOTERAPIA NEOADYUVANTE EN PACIENTES CON CÁNCER PANCREÁTICO

D. 15% a 20%.

Fundamentación: La experiencia con los estudios internacionales muestra que sólo es posible

realizar la cirugía en un 15% a 20% de los pacientes que presentan cáncer pancreático.

LOS DISPOSITIVOS QUE SUMINISTRAN DROGAS A REQUERIMIENTO DEL PACIENTE SON MUY EFECTIVOS PARA ALIVIAR EL DOLOR POSOPERATORIO

C. Acido glucurónico.

Fundamentación: La vía principal del metabolismo de la morfina es su conjugación con el ácido glucurónico tanto en el hígado como en los riñones.

VENTAJAS DE LA BIOPSIA DE MAMA ASISTIDA POR VACÍO EN EL MANEJO DE LESIONES SUBCLÍNICAS

A. La principal ventaja radica en los menores costos y en que mejorar el valor predictivo de la biopsia quirúrgica.

Fundamentación: La biopsia asistida por vacío insume menores costos, no requiere internación y permite evitar los efectos cicatrizales que se producen con la biopsia quirúrgica.

POTENCIAL DEL TRATAMIENTO DE INSULINOMAS PANCREÁTICOS CON ANÁLOGOS DE LA SOMATOSTATINA

D. Todas son correctas.

Fundamentación: En los pacientes que presentan un insulinoma, la secreción no controlada de insulina provoca diversos síntomas y signos secundarios a la neuroglucopenia y al aumento de la secreción de catecolaminas: ansiedad, mareo, cambios de personalidad, temblor, taquicardia, hipertensión paroxística, trastornos psiquiátricos, hasta coma.

MODIFICACIONES EN LA EVOLUCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA CON METÁSTASIS HEPÁTICAS

D. Receptores hormonales positivos y buena diferenciación histológica.

Fundamentación: Los factores que se asociaron con mejor pronóstico en pacientes con cáncer de mama avanzado fueron la presencia de receptores hormonales, tumores con diferenciación histológica buena o intermedia, buen estado funcional y escaso volumen tumoral.
