
Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

ESTRATEGIAS DISPONIBLES PARA LA PROFILAXIS DEL TROMBOEMBOLISMO

A. Puede administrarse por vía oral y es una droga económica.

Fundamentación: Estas son las principales ventajas de la droga. Sin embargo, las restantes características complican sustancialmente su uso.

AGRANULOCITOSIS INDUCIDA POR DROGAS EN LOS ANCIANOS

D. $0.1 \times 10^9/l$.

Fundamentación: La agranulocitosis idiosincrásica inducida por drogas clásicamente se define por recuento de neutrófilos menor a $0.1 \times 10^9/l$.

COMENTAN LOS RESULTADOS MAS IMPORTANTES DE ONCE TRABAJOS RECIENTES EN GASTROENTEROLOGIA Y HEPATOLOGIA

D. Sobredosis de acetaminofeno.

Fundamentación: El hallazgo más importante de un estudio reciente fue que la sobredosis de acetaminofeno y las reacciones idiosincrásicas a drogas han reemplazado a la hepatitis viral como causa de IHA.

RELACION ENTRE SINDROME DE INTESTINO IRRITABLE Y PROLIFERACION BACTERIANA

D. Todas son correctas.

Fundamentación: Entre los muchos factores de confusión que hacen difícil el diagnóstico del SII se encuentra la superposición con cuadros tales como el síndrome por fatiga crónica, la fibromialgia y la cistitis intersticial.

VALOR PRONOSTICO DE LA LIPOPROTEINA (a) EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDEA

D. Con todos ellos.

Fundamentación: Estas correlaciones sugieren que los niveles altos de lipoproteína (a) en pacientes con artritis reumatoidea podrían contribuir con la mayor incidencia de enfermedades vasculares en sujetos con AR.
