
Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

EFFECTO DE LA CIPROTERONA SOBRE EL PERFIL LIPIDICO EN PACIENTES CON POLIQUISTOSIS OVARICA

A. El EE/ACP disminuye el hiperandrogenismo y protege el endometrio.

Fundamentación: El EE/ACP es efectivo para reducir las manifestaciones clínicas del hiperandrogenismo y para proteger el endometrio (previene la metrorragia disfuncional, la hiperplasia y el cáncer de endometrio).

LA DIABETES COMO FACTOR DE RIESGO PARA PROGRESION DE LA DISFUNCION SISTOLICA

C. La diabetes mellitus tiene un impacto negativo sobre la progresión de la DSVI a la insuficiencia cardíaca sintomática.

Fundamentación: Los pacientes con miocardiopatía isquémica y diabetes tuvieron un aumento en el riesgo de progresión hacia la insuficiencia cardíaca sintomática, internación por insuficiencia cardíaca y muerte o desarrollo de síntomas, en comparación con aquellas personas que presentan cardiopatía isquémica sin diabetes.

POLIMORFISMO DEL GEN DE LA ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA EN PARAMETROS NEUROHORMONALES

C. DD.

Fundamentación: La actividad de la ECA sérica antes y después de la dosis de enalapril fue significativamente más elevada en el grupo con genotipo DD que en aquellos con genotipos II e ID.

LAS PLACAS ATEROSCLEROTICAS SON MAS INFLAMATORIAS EN LOS DIABETICOS

B. En el 90% de los casos.

Fundamentación: La experiencia con los estudios epidemiológicos demuestra que la diabetes de tipo 2 representa aproximadamente el 90% de todos los casos de diabetes.

PARAMETROS PREDICTIVOS EN PANCREATITIS AGUDA

A. Escala APACHE II y concentración de interleuquina (IL) 6.

Fundamentación: Estos marcadores son predictivos pronósticos útiles en las primeras horas de enfermedad.

CRITERIOS RADIOGRAFICOS PARA PREDECIR AGRANDAMIENTO DE HEMATOMA INTRACEREBRAL

D. Aumento del volumen en 1.45 veces o más.

Fundamentación: El criterio radiológico para considerar agrandamiento de la lesión es el aumento del volumen del hematoma en 1.45 veces o más.

ESTUDIAN FACTORES PRONOSTICOS EN TUMORES RENALES

D. Sólo los dos primeros.

Fundamentación: La presencia de metástasis y el grado tumoral influyen significativamente en la evolución de los tumores de riñón que se diagnostican en forma casual.

Trabajos Distinguidos, Serie Clínica Médica, integra el Programa SIIC de Educación Médica
Continuada