



Volumen 12, Número 4, Enero 2006

Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

LOS ANTIINFLAMATORIOS SON TERAPIA DE PRIMERA LINEA EN LA ESPONDILITIS ANQUILOSANTE

D. Antiinflamatorios no selectivos e inhibidores de la ciclooxigenasa-2.

Fundamentación: Los antiinflamatorios no esteroideos no selectivos y los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa-2 representan la terapia de primera línea en pacientes con espondilitis anquilosante.

IMPACTO DE MANTENER VALORES NORMALES DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA EN PACIENTES DIABETICOS

C. US 50 000 millones.

Fundamentación: En EE.UU, el ahorro financiero total sería de aproximadamente u\$s 50 000 millones en los próximos 10 años si los pacientes diabéticos alcanzan y mantienen niveles de HbA_{1c} de 7%.

LA DEMENCIA COMO ASOCIACION EN OTRAS PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS

D. Todas son correctas.

Fundamentación: El deterioro cognitivo ha sido reconocido como una característica clínica en varios trastornos psiquiátricos, como esquizofrenia, depresión y trastorno bipolar.

LAS MOLECULAS DE ADHESION CELULAR EN PREDICION DEL RIESGO DE ENFERMEDAD CORONARIA

D. Todas son correctas.

Fundamentación: Las moléculas de adhesión incluyen las familias de inmunoglobulinas, integrinas, selectinas, caderinas y moléculas tipo mucina.

USO DE OPIOIDES A LARGO PLAZO EN LA ENFERMEDAD DE CROHN

B. La polifarmacia, el hábito de fumar, el aumento en la actividad de la enfermedad.

Fundamentación: Los siguientes factores se relacionaron en forma independiente con la utilización crónica de opioides en este tipo de pacientes: el incremento en la actividad de la enfermedad, la polifarmacia (especialmente drogas neuropsiquiátricas) y el hábito de fumar.

INDICACION DE ESTATINAS EN LA SEPSIS DEBIDO A SUS EFECTOS ANTIINFLAMATORIOS

D. Todas son correctas

Fundamentación: Los efectos beneficiosos de las estatinas se deben al descenso de los niveles lipídicos y a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

LOSARTAN EN COMPARACION CON CAPTOPRIL PARA LA INSUFICIENCIA CARDIACA CRONICA

B. Candesartán.

Fundamentación: El estudio CHARM informó una mejoría significativa en el criterio de valoración combinado de muerte cardiovascular e internación por insuficiencia cardíaca del candesartán, en comparación con placebo, en pacientes con insuficiencia cardíaca con intolerancia a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.
