
● Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

LA COLONIZACIÓN DE LAS MANOS DE LOS RESIDENTES CON GÉRMEENES RESISTENTES NO AUMENTA CON EL TIEMPO DE ENTRENAMIENTO

B. Sumersión de las manos en solución estéril y cultivo de una muestra del líquido.

Fundamentación: Se sumerge la mano a estudiar en una solución buffer estéril y se la masajea con la otra mano a través de la bolsa que contiene la primera, a fin de transferir los microorganismos cutáneos al medio líquido. Las muestras de este último se cultivan y las colonias se tipifican mediante coloraciones.

VALOR DIAGNOSTICO DE LA ECOGRAFIA LUEGO DEL PRIMER EPISODIO DE INFECCION URINARIA FEBRIL EN NIÑOS

C. Aproximadamente un 15%.

Fundamentación: La ecografía renal y del tracto urinario detectó alteraciones significativas en el tracto urinario en el 14.8% de los niños estudiados.

LOS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES SON UTILES EN LA EVALUACIÓN DE LOS TUMORES GASTROINTESTINALES DEL ESTROMA

D. Fluorodeoxiglucosa.

Fundamentación: La tomografía por emisión de positrones con F-fluorodeoxiglucosa, un análogo de la glucosa que se capta a nivel celular pero no se metaboliza, es útil para evaluar cambios funcionales a nivel celular.

LOS TRASTORNOS CUTÁNEOS SON FRECUENTES EN LAS ENFERMEDADES TIROIDEAS

D. Todas ellas.

Fundamentación: Los trastornos de la pigmentación, la caída del cabello, la piel seca y gruesa y la sudoración son algunas de las anomalías cutáneas que pueden aparecer en pacientes con hipotiroidismo.

EVALÚAN EL RIESGO DEL EMBARAZO EN MUJERES CON SÍNDROME DE MARFÁN

D. Uno/5 000 recién nacidos.

Fundamentación: El síndrome de Marfán es una alteración del tejido conectivo heredada con carácter autonómico dominante; la incidencia estimada es de aproximadamente 1/5 000 recién nacidos, de los cuales el 25% a 30% representa mutaciones nuevas.

LA POLIMIALGIA REUMÁTICA ES UN TRASTORNO MUY FRECUENTE EN PERSONAS DE EDAD AVANZADA

D. Todas ellas.

Fundamentación: La presencia de dolor en hombros, cuello y caderas, la elevación de los reactantes de fase aguda y la excelente respuesta a los corticoides son las principales características de la polimialgia reumática.

Trabajos Distinguidos, Serie Clínica Médica, integra el Programa SIIC de Educación Médica
Continuada