

---

## ● Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

---

### **NUEVAS ESTRATEGIAS HIPOLIPEMIANTES EN PACIENTES CON RESPUESTA PARCIAL A LAS ESTATINAS**

D. Todas estas alternativas son útiles y seguras.

**Fundamentación:** Cuando las estatinas no son suficientes para alcanzar las metas en términos de los valores de lípidos, la terapia simultánea con ezetimibe y estatinas, las estatinas más ácido nicotínico o el fenofibrato más ezetimibe pueden ser de ayuda. La elección dependerá de cuál es el objetivo primordial: descender el colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad o los triglicéridos o aumentar el colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad.

---

### **ESTUDIO DE LOS FACTORES RELACIONADOS CON LA PREPARACIÓN PURGANTE QUE AFECTAN EL EXITO DE LA COLONOSCOPIA**

D. El uso de fosfato de sodio

**Fundamentación:** El empleo de fosfato de sodio en la preparación de los pacientes sometidos a colonoscopia, además de la adhesión adecuada a las instrucciones recibidas con respecto al proceso, representan los factores más importantes en el pronóstico del éxito de la colonoscopia.

---

### **EL PANTOPRAZOL MEJORÓ LA CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES CON REFLUJO GASTROESOFÁGICO SEGÚN UN CUESTIONARIO DE PUNTUACIÓN VALIDADO**

D. Los pacientes mostraron deterioro de la calidad de vida antes del tratamiento y mejoría significativa luego de recibir pantoprazol.

**Fundamentación:** El promedio general de la calidad de vida, según el cuestionario traducido, correspondió a 26 antes del tratamiento y disminuyó a 4.5 después del mismo ( $p < 0.001$ ).

---

### **LA ANFOTERICINA B LIPOSOMAL EN COMPARACIÓN CON OTROS PREPARADOS DEL MISMO TIPO EN UN MODELO DE ASPERGILOSIS PULMONAR**

C. Anfotericina B liposomal

**Fundamentación:** La anfotericina B liposomal, por su menor nefrotoxicidad, puede utilizarse en

dosis más altas y por lo tanto, asociarse con mayor eficacia.

---

### **EL MELOXICAM ES SEGURO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA A LA ASPIRINA Y OTROS ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES**

**A.** 7.5 mg

**Fundamentación:** Mediante la prueba de provocación controlada con meloxicam se comprueba que la administración de 7.5 mg es segura en casi todos los pacientes con estas características.

---

### **CUESTIONAN LA UTILIDAD DE LOS BETABLOQUEANTES PARA TRATAR LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL**

**D.** Disfunción ventricular secundaria a infarto de miocardio.

**Fundamentación:** Diferentes investigadores notificaron una reducción del 23% de la mortalidad general, del 25% de las muertes por causa cardiovascular y de hasta el 41% de los eventos coronarios recurrentes, no fatales, en supervivientes de un infarto agudo de miocardio tratados con propranolol, timolol o carvedilol, a largo plazo.

---

### **EL CONTROL OPTIMO DE LA PRESIÓN ARTERIAL SE ASOCIA CON GRANDES BENEFICIOS EN TODOS LOS PACIENTES**

**Fundamentación:** En general, los diuréticos del grupo tiazida, los beta bloqueantes, los antagonistas de los canales de calcio y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina son igualmente eficaces y seguros en el tratamiento de la presión arterial. Sin embargo, en determinados pacientes, alguna opción puede ser más beneficiosa que otra.

---

### **EL *STAPHYLOCOCCUS AUREUS* AISLADO EN ORINA DE PACIENTES CRÓNICOS: ¿CONTAMINANTE O CAUSANTE?**

**D.** El 10%.

**Fundamentación:** El 75% de los pacientes provino de centros de cuidados crónicos, el 82% estaba con catéter urinario y el 7% tuvo antecedentes de maniobras invasivas urinarias. Solamente el 11% de los pacientes no tuvo ningún elemento invasivo.

---