

LA OBESIDAD ES UN FACTOR DE RIESGO INDEPENDIENTE DE ENFERMEDAD CORONARIA

A. Europea

Fundamentación: La población europea blanca presenta mayor predisposición a la dislipidemia aterogénica.

ANALIZAN LA PARTICIPACION DE FACTORES NEUROHORMONALES EN HIPERTENSION ARTERIAL

D. Todos Ellos

Fundamentación: Estos son algunos de los factores que mediante una compleja red de interacción desempeñarían un papel crucial en el inicio y progresión de la hipertensión arterial

DETERMINAN LA RELACION ENTRE EL MERCURIO Y EL RIESGO DE INFARTO DE MIOCARDIO

C. Relación Directa

Fundamentación: El mercurio encontrado en uñas de los dedos del pie se asoció directamente con el riesgo de infarto de miocardio.

CARACTERISTICAS DE LA CARDIOPATIA ISQUEMICA EN LOS DIABETICOS

A. Duración de la Diabetes.

Fundamentación: La duración de la diabetes es el factor predictivo más importante de cardiopatía isquémica.

MEJORIA DE LA HIPERHOMOCISTINEMIA Y FUNCION ENDOTELIAL

A. Mejoría del Flujo Coronario dependiente del Endotelio

Fundamentación: El tratamiento durante 6 meses con ácido fólico y cobalamina se asoció con mejoría notable de la función endotelial (expresada en el incremento del flujo en respuesta a la infusión de acetilcolina) en estos pacientes

EL ABANDONO DEL TABACO DISMINUYE LA FRECUENCIA DE COMPLICACIONES POSQUIRURGICAS

D. Complicaciones de la incisión

Fundamentación: La suspensión del tabaquismo semanas antes de una cirugía disminuye significativamente la incidencia de complicaciones asociadas con la herida quirúrgica.

FRECUENCIA CARDIACA COMO FACTOR PREDICTIVO DE ENFERMEDADES EN MUJERES DE EDAD AVANZADA

D. Todas ellas

Fundamentación: La FCR de 80 o más latidos por minuto aumentó linealmente el riesgo de todos estos parámetros de evolución.