
Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

COMPARAN DOS TERAPIAS ANTIHIPERTENSIVAS CLASICAS

A. Clortalidona.

Fundamentación: El *Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT)* brinda evidencia categórica de la superioridad de la clortalidona sobre la doxazosina en pacientes con hipertensión arterial y factores de riesgo cardiovascular.

FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN DIABETICOS

A. Vitamina B6.

Fundamentación: La homocisteína se produce durante el metabolismo de la metionina a través de los compuestos adenosilados S-adenosilmetionina y S-adenosilhomocisteína. La homocisteína puede ser remetilada a metionina en una reacción que requiere folato y vitamina B12, o puede ser transulfurada a cisteína, para lo cual se requiere vitamina B6.

LA SUSPENSIÓN DEL HABITO DE FUMAR REDUCE EL RIESGO DE MORTALIDAD

D. 36%.

Fundamentación: Este 36% de reducción del riesgo parece ser al menos tan grande como el que se observa con otros tratamientos de prevención secundaria, como el uso de estatinas para reducir los niveles de colesterol (29% de reducción), aspirina (15% de reducción), betabloqueantes (23% de reducción) o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (23% de reducción).

ESTUDIAN EL EFECTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA SOBRE LA PREDISPOSICIÓN GENÉTICA A LA HIPERTENSIÓN SISTÓLICA CENTRAL

D. Mayor actividad física.

Fundamentación: La obesidad abdominal es un importante factor determinante del IA mientras que la actividad física reduce considerablemente el riesgo a mayor IA determinado en forma genética.

IMPORTANCIA DE LA DIABETES EN LA INCIDENCIA DE PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR

C. Todas ellas.

Fundamentación: Estas son las cuatro alteraciones mayores que pueden contribuir con el desarrollo de la vasculopatía en pacientes con diabetes.

LOS PACIENTES CON DISFUNCIÓN ERECTIL TIENEN MAYOR RIESGO CARDIOVASCULAR

A. De enfermedad cardiovascular.

Fundamentación: La disfunción eréctil en pacientes de más de 40 años se asocia con riesgo cardiovascular aumentado. Debe considerarse el tratamiento preventivo en este grupo de pacientes.
