



Volumen 3, Número 2, Febrero 2004

● Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

IDENTIFICAN MARCADORES DE ATEROSCLEROSIS

D. Interleuquinas 1 y 6.

Fundamentación: La PCR es una proteína que activa el complemento. El principal estímulo para su secreción es la interleuquina 1 y 6, e indirectamente el factor de necrosis tumoral ALFA. Los niveles circulantes de PCR se relacionan con varios factores de riesgo cardiovascular.

LA DISFUNCION ERECTIL PUEDE SER EL SINTOMA INICIAL DE LA ENFERMEDAD CORONARIA

D. La disfunción del endotelio vascular del *corpus cavernosum*.

Fundamentación: El compromiso de la relajación dependiente del endotelio se ha asociado a disfunción eréctil, y la hiperlipidemia podría estar involucrada en el mecanismo fisiológico causal.

NUEVOS FACTORES DE RIESGO PARA LA ENFERMEDAD VASCULAR ATEROSCLEROTICA

D. Inhibición de la fibrinólisis del coágulo en los sitios de lesión tisular

Fundamentación: Su papel parece ser la inhibición de la fibrinólisis del coágulo en los sitios de lesión tisular, ya que por su homología estructural con el plasminógeno compite con éste por susreceptores.

Trabajos Distinguidos, Serie Factores de Riesgo, integra el Programa SIIC de Educación Médica Continua