



Volumen 3, Número 5, Septiembre 2004

● Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

HDL BAJO COMO FACTOR DE RIESGO DE ENFERMEDAD CORONARIA

B. Fibratos.

Fundamentación: Los fibratos son la droga de elección en pacientes con hipertrigliceridemia y niveles de HDL bajos, mientras que las estatinas se prefieren en aquellos con niveles de HDL bajos y de LDL altos.

TRATAMIENTO DE LAS DISLIPIDEMIAS EN MUJERES

B. Estatinas.

Fundamentación: Las estatinas son el eje del tratamiento hipolipemiante en la actualidad.

SUSTITUCION DE ESTATINAS EN EL TRATAMIENTO HIPOLIPEMIANTE

A. Disminuir los niveles de triglicéridos, de colesterol total y asociado a lipoproteínas de baja densidad (LDLc) y aumentar los de colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad (HDLc).

Fundamentación: Las estatinas han demostrado ser sumamente eficaces para disminuir los niveles de colesterol total, LDLc, aumentar el HDLc y disminuir los triglicéridos.

ASPECTOS NUTRICIONALES EN LA PREVENCION DE LA HIPERTENSION Y ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

C. < 300 mg

Fundamentación: El consumo de colesterol en la dieta debe limitarse a menos de 300 mg por día principalmente a través de la reducción de las grasas.

Trabajos Distinguidos, Factores de Riesgo , integra el Programa SIIC de Educación Médica
Continuada