

Autoevaluaciones de Lectura

Por cada artículo de las secciones Artículos originales y distinguidos se formula una pregunta, con cuatro opciones de respuesta. La correcta, que surge de la lectura atenta del trabajo, se indica en el sector Respuestas Correctas, acompañada del fundamento escrito por el especialista que elaboró la pregunta.

TD N°	Enunciados	Seleccione sus opciones
1	Señale la opción correcta con respecto a la enfermedad celíaca:	A) Consiste en una inflamación crónica de la mucosa intestinal producida por la ingesta de gluten en la dieta diaria. B) Afecta a individuos genéticamente predispuestos. C) La susceptibilidad a la enfermedad tiene un componente genético, con relevancia de los genes de los HLA. D) Todas son correctas.
2	¿De qué manera progresa la cápsula endoscópica dentro de la luz del intestino delgado?	A) Por movimientos helicoidales de autopropulsión. B) Por compresión antihoraria periumbilical de la pared abdominal anterior. C) De modo pasivo por el peristaltismo del tubo digestivo. D) Mediante electroimán aplicado sobre la piel con control ecográfico.
3	La intolerancia a la lactosa (LL) se caracteriza clínicamente por:	A) Diarrea osmótica. B) Dolor abdominal tipo retortijón. C) Ruidos abdominales. D) Todos los anteriores.
4	En la actualidad se considera que existen 2 tipos principales de hipoxia tumoral (HT):	A) Limitada por la difusión crónica y por la perfusión aguda. B) Limitada por la difusión crónica. C) Limitada por la difusión aguda. D) Ilimitada.
5	Indique cuál de los siguientes alimentos contiene serotonina:	A) Banana. B) Tomate. C) Brócoli y berenjena. D) Todas son correctas.
6	¿Qué factores son útiles para predecir la evolución de la enfermedad de Crohn en los 5 años que siguen al diagnóstico?	A) La edad. B) La presencia de lesiones perianales en el momento del diagnóstico. C) La demanda de corticoides en la primera exacerbación. D) Todos ellos.
7	¿En qué consiste el tratamiento quirúrgico curativo de la enfermedad de Crohn?	A) Ileo-transverso-anastomosis látero-lateral. B) Colectomía o resección segmentaria del intestino delgado o resección parcial de colon y de delgado en continuidad. C) Gastroenteroanastomosis en Y de Roux. D) Resección abdominoperineal de Miles.
8	¿Qué tipo de bronquiectasias estarían asociadas con infección por <i>Helicobacter pylori</i> ?	A) Las del síndrome de Young. B) Las idiopáticas. C) Las que se observan en pacientes con disquinesia ciliar. D) <i>Helicobacter pylori</i> no parece participar en la etiopatogenia de las bronquiectasias.
9	¿Con que tipo de fármacos se recomienda comenzar el tratamiento del dolor asociado con la pancreatitis crónica?	A) Con enzimas pancreáticas. B) Con aluprinol. C) Con octeotride. D) Con antiinflamatorios no esteroideos o paracetamol.
10	¿Cómo se mide la calidad de vida de un conjunto de pacientes portadores de la misma enfermedad que cursan etapas evolutivas similares?	A) Mediante proteinograma electroforético, en especial el dosaje de las albúminas. B) Con un cuestionario sobre síntomas característicos, aspectos emocionales, cognitivos y de comportamiento social. C) Por la relación entre las proteínas ingeridas en 24 horas y el valor calórico de la ración alimentaria diaria total. D) Por el índice de masa corporal y la densitometría ósea.

Respuestas Correctas

TD N°	Respuestas	Fundamentos	Opción
10	Con un cuestionario sobre síntomas característicos, aspectos emocionales, cognitivos y de comportamiento social.	La calidad de vida es una percepción y por lo tanto totalmente subjetiva. No existen medidas de las magnitudes conocidas para establecer valores comparativos.	B
9	Con antiinflamatorios no esteroideos o paracetamol.	Los autores recomiendan comenzar en forma escalonada con paracetamol o antiinflamatorios no esteroideos, luego tramadol si no hay mejoría y, por último, morfina de liberación controlada y metadona como fármacos de elección.	D
8	<i>Helicobacter pylori</i> no parece participar en la etiopatogenia de las bronquiectasias.	Aunque existe considerable similitud entre las lesiones pépticas ulcerosas y las bronquiectasias, los resultados de estudios inmunohistoquímicos no avalan la presencia de <i>H. pylori</i> en estas últimas.	D
7	Colectomía o resección segmentaria del intestino delgado o resección parcial de colon y de delgado en continuidad.	Las operaciones consisten en la exéresis del o de los segmentos afectados del intestino, con suficiente margen pero sin la radicalidad requerida para un cáncer.	B
6	Todos ellos.	La edad menor de 40 años, la presencia de enfermedad perianal en el momento del diagnóstico y la necesidad de terapia con esteroideos en la primera exacerbación son factores predictivos independientes de evolución desfavorable en los 5 años siguientes.	D
5	Todas son correctas.	El consumo fue estimado mediante el cálculo del promedio de porciones de alimentos como pomelo, melón, brócoli, berenjena, espinaca y coliflor (0 a 15 g/g) y (3 a 15 g/g) y bananas (> 15 g/g).	D
4	Limitada por la difusión crónica y por la perfusión aguda.	La HT limitada por la difusión crónica aparece porque las células están alejadas de los capilares nutrientes como para difundir el oxígeno. En la hipoxia intermitente/aguda, las células permanecen hipoxicas durante un lapso variable.	A
3	Todos los anteriores.	La HT curvas con sintomatología inespecífica, en la mayoría de los casos hay malestar abdominal con dolor tipo cólico, ruidos abdominales y diarrea que aparecen media hora después de la toma de leche o derivados.	D
2	De modo pasivo por el peristaltismo del tubo digestivo.	La cápsula progresa merced a los movimientos peristálticos que la propulsan desde el duodeno hasta el ciego. Durante el recorrido de 8 horas adquiere cerca de 50 000 imágenes de la superficie de la mucosa intestinal.	C
1	Todas son correctas.	Todas las opciones enunciadas reflejan las características de la enfermedad celíaca.	D