



Volumen 6, Número 6, Junio 2004

## ● Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

### **EVALUACION DE LA PERISTALSIS ESOFAGICA MEDIANTE LA UTILIZACION DE DIEZ DEGLUCIONES LIQUIDAS**

**C.** La utilización de diez degluciones es suficiente para realizar un diagnóstico manométrico correcto.

**Fundamentación:** Diez degluciones son suficientes para aportar un diagnóstico manométrico correcto en la mayoría de los pacientes, ya que sólo 2% del total tendrá un diagnóstico diferente con la utilización de degluciones adicionales.

### **ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO EN LA FIBROSIS HEPATICA**

**A.** Células miofibroblásticas.

**Fundamentación:** El colágeno es producido esencialmente por células miofibroblásticas que derivan de células hepáticas activadas o de fibroblastos portales activados.

### **MANIFESTACIONES CLINICAS, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS EMERGENCIAS DE LA VIA BILIAR**

**D.** La colangitis es la complicación litiásica con mayor mortalidad.

**Fundamentación:** De las complicaciones más comunes de los cálculos en la vesícula, la colangitis es la entidad más rápidamente letal, lo que hace que el diagnóstico y el tratamiento rápidos sean imperativos. Los pacientes que no responden al tratamiento conservador y que no tienen un drenaje apropiado tienen tasas de mortalidad que se aproximan al 100%.

### **LA LEVOSULPIRIDA AYUDA A PACIENTES CON DISPEPSIA FUNCIONAL**

**A.** Aumenta el tono gástrico en personas con dispepsia funcional.

**Fundamentación:** La levosulpirida aumenta el tono gástrico en personas con dispepsia funcional, mejorando los síntomas, pero no tiene acción en personas sanas sin síntomas gastrointestinales.