

---

## **Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas**

---

### **MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS DE LA COLESTASIS INTRAHEPÁTICA FAMILIAR PROGRESIVA TIPO 1**

**B.** Una colestasis intrahepática familiar.

**Fundamentación:** Los estudios fisiopatológicos indican que la originalmente descrita enfermedad de Byler es una colestasis intrahepática familiar progresiva de tipo 1.

---

### **CARACTERÍSTICAS DEL COMPROMISO DE LA MUCOSA GÁSTRICA RELACIONADO CON EL ESTRÉS**

**B.** Ventilación mecánica.

**Fundamentación:** Un estudio multicéntrico en 2 252 pacientes mostró que los dos factores de riesgo más importantes para la hemorragia gastrointestinal relacionada con el estrés fueron la insuficiencia respiratoria (OR = 15.6) y las coagulopatías (OR = 4.3) El riesgo aumenta con el número de días de ventilación mecánica y la permanencia en la UCI.

---

### **SINDROMES DE FATIGA CRÓNICA Y DE INTESTINO IRRITABLE**

**C.** Biológicos, psicológicos y sociales.

**Fundamentación:** El SFC y el SII son condiciones que reconocen causas biológicas, psicológicas y sociales.

---

### **COMPLICACIONES DE LAS PANCREATITIS AGUDAS Y CRÓNICAS**

**A.** La hemorragia aguda debido a la rotura de un pseudoaneurisma es la complicación más rápidamente mortal en las pancreatitis crónicas.

**Fundamentación:** La hemorragia aguda por pseudoaneurismas es la complicación más rápidamente mortal de la pancreatitis crónica. La mortalidad de los pacientes no tratados es de 90% a 100%, y aun cuando se la trata, la tasa varía entre 12% y 50%.

---