



Volumen 7, Número 3, Octubre 2004

● Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

ACTUALIZACION DEL MANEJO CLINICO DE LA HEMATEMESIS Y LA MELENA

C. Los pacientes con riesgo elevado de resangrado deben recibir infusión endovenosa de dosis elevadas de inhibidores de la bomba de protones.

Fundamentación: Esta infusión está indicada luego de la aplicación de terapia endoscópica con inyección. No está indicada para pacientes con bajo riesgo de resangrado.

COMPLICACIONES GASTROINTESTINALES DE LOS ANTI INFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS

C. Indometacina.

Fundamentación: El AINE convencional que se encuentra relacionado con el mayor riesgo para complicaciones gastrointestinales es la indometacina.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE LAS LESIONES HEPATICAS NO TUMORALES

A. Hiperintensidad en T2.

Fundamentación: El carcinoma hepatocelular recurrente es generalmente hiperintenso en T2.

EL TRATAMIENTO PARA ERRADICAR *HELICOBACTER PYLORI* NO TIENE EFECTO BENEFICIOSO SOBRE LA PIROSIS Y LA ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFAGICO

C. La erradicación de *Helicobacter pylori* no tuvo efecto neto sobre los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico.

Fundamentación: En los participantes del estudio con infección por el germen, el tratamiento activo no tuvo efecto sobre la prevalencia global de la pirosis o de reflujo gastroesofágico.

Trabajos Distinguidos, Gastroenterología , integra el Programa SIIC de Educación Médica
Continuada