



Volumen 7, Número 4, Noviembre 2004

Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

ESTRATEGIA PARA IDENTIFICAR FAMILIAS CON RIESGO DE CANCER COLORRECTAL

D. 28%

Fundamentación: La identificación de pacientes de riesgo alto mediante esta estrategia alcanza un 28%, muy favorable en comparación con el 3.2% y el 4.4% en estudios que aplican rastreo de población.

ENFERMEDAD ULCEROSA PEPTICA EN PACIENTES CON TRASPLANTE RENAL

C. Pulsos de metilprednisolona y azatioprina.

Fundamentación: los pulsos de metilprednisolona, la inyección de globulina antitimocítica y la azatioprina se asociaron con la presencia de EUP; pero no así el consumo de antiinflamatorios no esteroides, aspirina, CsA, prednisolona, tacrolímús y mofetil micofenolato.

DIVERTICULITIS: CUANDO Y COMO OPERAR

B. Peritonitis fecal.

Fundamentación: En el estadio IV de la clasificación de Hinchey, la enfermedad diverticular se asocia con la peritonitis fecal y constituye una emergencia quirúrgica, debe tratarse inmediatamente después de la estabilización del paciente.

REVISAN EL DIAGNOSTICO Y MANEJO DE LAS NEOPLASIAS QUISTICAS PANCREATICAS

D. Seudoquistes inflamatorios.

Fundamentación: Los seudoquistes inflamatorios constituyen la mayoría de esas lesiones.

Trabajos Distinguidos, Gastroenterología, integra el Programa SIIC-Sociedad Argentina de Gastroenterología (SAG) de Educación Médica Continuada