

---

## ● **Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas**

### **UTILIDAD PRONOSTICA DEL INDICE DE ACTIVIDAD EN COLITIS ULCEROSA**

A. Índice de actividad clínica (UCAI).

**Fundamentación:** El curso clínico es notoriamente distinto en sujetos con UCAI alto o bajo en ambos grupos de tratamiento, fenómeno que sugiere que este parámetro puede ser un factor predictivo importante de supervivencia aun cuando se indican diferentes esquemas terapéuticos.

---

### **ASOCIACION ENTRE NIVELES DE SELENIO Y RECURRENCIA DE ADENOMAS COLORRECTALES**

C. Existe una asociación inversa y significativa entre los niveles plasmáticos de selenio y la recurrencia de los adenomas colorrectales.

**Fundamentación:** Los datos hallados aportan una mayor evidencia del efecto protector del selenio sobre el desarrollo de neoplasias colorrectales.

---

### **CAUSAS DE MUERTE EN PACIENTES CON HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL GRAVE**

C. El puntaje Charlson permite predecir la mortalidad en estos sujetos.

**Fundamentación:** El riesgo de muerte en los pacientes con HGI internados en UCI aparenta ser mayor cuando mayor es la edad del paciente y cuando el puntaje de Charlson es alto.

---

### **ESTABLECEN PERFIL DEL PACIENTE CON DISPEPSIA SOMETIDO A EVALUACION ENDOSCOPICA**

A. Sexo masculino.

**Fundamentación:** La neoplasia esofágica en pacientes con dispepsia está asociada con sexo masculino, edad avanzada, origen asiático o indígena, descenso de peso y vómitos.

---

### **LOS INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES PODRIAN MEJORAR SINTOMAS ASOCIADOS CON EL REFLUJO GASTROESOFAGICO**

C. No mejoran la función pulmonar.

**Fundamentación:** La terapia con inhibidores de la bomba de protones raramente parece mejorar la función pulmonar en los pacientes asmáticos que también tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico.

---