

# Autoevaluaciones de Lectura

Por cada artículo de las secciones Reseñas distinguidas y Novedades distinguidas se formula una pregunta, con tres opciones de respuesta. La afirmación acertada, que surge de la lectura atenta del trabajo, es citada en el apartado Respuestas Correctas, en esta misma página, acompañada de una breve fundamentación.

TD N°	Enunciación	Seleccione su opción
1	¿Cuál fue el riesgo de mortalidad materna entre las embarazadas víctimas de violencia doméstica versus las no maltratadas?	A) Dos veces más alto. B) Similar. C) Tres veces más alto.
2	¿Cuál es la medida médica más eficaz para el tratamiento de la endometriosis rectovaginal persistente?	A) Administración de anticonceptivos combinados. B) Implantación de un dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel. C) Administración de acetato de leuprolida.
3	¿Cuál de las siguientes opciones es correcta?	A) La evaluación por un experto en patología mamaria no es necesaria para el manejo del CDIS. B) Las evaluaciones patológicas secundarias mejoran la valoración del riesgo de recurrencia local. C) La información patológica incompleta no influye sobre la decisión terapéutica.
4	Señale el enunciado correcto	A) Se observó mayor oscilación postural y disminución de la cinestesia de la rodilla en las mujeres con SPM. B) Los niveles hormonales son diferentes en las mujeres con SPM y sin él. C) La intensidad de los síntomas de SPM disminuye gradualmente durante la fase lútea.
5	¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?	A) La doxorubicina es más efectiva que el AN-152 para inducir apoptosis en las células cancerígenas LHRH-R positivas. B) Sólo los agonistas de LHRH suprimen el crecimiento tumoral en las células de cáncer mamario. C) Más de la mitad de los carcinomas mamaros expresan el receptor de la hormona liberadora de hormona luteinizante (LHRH-R).
6	En el síndrome de ovario poliquístico (SOP):	A) Se logran mejores resultados sobre la ovulación con tratamiento prolongado con metformina. B) El tratamiento combinado con metformina más CC parece ser más efectivo para el logro del embarazo. C) Con el tratamiento con metformina se logran más embarazos que con placebo.
7	Las indicaciones de la terapia hormonal (TH) son el tratamiento del síndrome climatérico y las prevención de la osteoporosis en posmenopáusicas expuestas a un riesgo:	A) Bajo. B) Intermedio. C) Elevado.
8	¿En cuál de las siguientes situaciones se observan los niveles más altos de gonadotropina coriónica humana (hCG)?	A) Preeclampsia (PE) grave. B) PE leve. C) PE superpuesta.
9	¿Cuál de las siguientes opciones es correcta?	A) En los casos de parto vaginal poscesárea, el puntaje de Apgar menor de 7 a los 5 minutos fue menos frecuente. B) No hubo diferencias significativas en las muertes maternas al comparar el parto poscesárea con la cesárea programada repetida. C) El porcentaje de mujeres a las que se les ofrece parto luego de una cesárea es mayor al 50%.
10	¿Qué parámetro predice mejor la aparición de convulsiones neonatales?	A) Acidosis. B) Duración del patrón anormal de frecuencia cardíaca fetal. C) Bradicardia.
11	¿Cuál es el agente más eficaz para el tratamiento médico de la hemorragia uterina disfuncional?	A) Danazol. B) Acido tranexámico. C) Acido mefenámico.
12	¿Con cuál variable se asocia la modificación del flujo sanguíneo uterino posterior a la administración de un bloqueante alfaadrenérgico?	A) Presión arterial media. B) Concentración de catecolaminas. C) Volumen plasmático.
13	¿Qué factor se asocia con la intención de utilizar la terapia de reemplazo hormonal en la menopausia?	A) Creencias negativas respecto de la menopausia. B) Edad. C) Estado de salud.
14	¿Cuál es la droga que menos se utiliza en el tratamiento de la hipertensión grave de la gestación en Canadá?	A) Labetalol parenteral. B) Sulfato de magnesio. C) Nifedipina de acción corta o de liberación sostenida.
15	La ecocardiografía fetal, en relación con su precisión diagnóstica, tiene:	A) Alta sensibilidad y baja especificidad. B) Alta sensibilidad y alta especificidad. C) Baja sensibilidad y alta especificidad.

## Respuestas Correctas

TD N°	Respuestas Correctas	Fundamentación	Clave
1	Tres veces más alto.	Una mujer víctima de violencia durante la gestación tiene 3 veces más probabilidades de ser asesinada por su pareja en comparación con una mujer no maltratada.	C
2	Administración de anticonceptivos combinados.	La implantación de un dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel es la medida más eficaz para el tratamiento de la endometriosis rectovaginal persistente.	A
3	Valoración del riesgo de recurrencia local.	Las evaluaciones patológicas secundarias mejoran la valoración del riesgo de recurrencia local. La morbilidad en las que presentan menor riesgo.	B
4	Se observó mayor oscilación postural y disminución de la cinestesia de la rodilla en las mujeres con SPM.	La mayor oscilación postural, especialmente en la FLM, y la disminución de la cinestesia en la articulación de la rodilla de las mujeres con SPM pueden contribuir al mayor riesgo de lesiones.	A
5	Más de la mitad de los carcinomas mamaros expresan el receptor de la hormona liberadora de hormona luteinizante (LHRH-R).	La presencia de receptores para la hormona liberadora de hormona luteinizante (LHRH-R) fue informada en 52% a 64% de los cánceres de mama humanos.	C
6	El tratamiento combinado con metformina más CC parece ser más efectivo para el logro del embarazo.	Cuando se comparó la metformina más CC con el CC o la metformina sola, pareció haber beneficio significativo en pacientes con SOP, tanto hiperandrogénicas como obesas.	B
7	Elevado.	La TH debe ser reservada para el tratamiento del síndrome climatérico y la prevención de la osteoporosis en mujeres con riesgo elevado para esta enfermedad.	C
8	Preeclampsia (PE) grave.	Los valores más altos de hCG se observaron en el grupo de mujeres con PE grave, en comparación con el grupo de hipertensión crónica, de PE leve y el de mujeres normotensas.	A
9	No hubo diferencias significativas en las muertes maternas al comparar el parto poscesárea con la cesárea programada repetida.	No se observaron diferencias significativas entre la cesárea programada repetida y el parto poscesárea programado en cuanto a muertes maternas, dehiscencia de la cicatriz uterina, rotura de la cicatriz uterina o puntaje de Apgar menor de 7 a los 5 minutos.	B
10	Duración del patrón anormal de frecuencia cardíaca fetal.	En el contexto de acidosis neonatal, la aparición de convulsiones se relaciona con el período de estrés: duración del patrón anormal de frecuencia cardíaca.	B
11	Acido tranexámico.	El ácido tranexámico es el agente más eficaz para el tratamiento médico de la hemorragia uterina disfuncional.	B
12	Presión arterial media.	Existe una relación directa entre la presión arterial media y la variación del flujo sanguíneo uterino que se produce con la administración de un bloqueante alfaadrenérgico.	A
13	Creencias negativas respecto de la menopausia.	Las creencias negativas respecto de la menopausia están asociadas con la intención de utilizar la terapia de reemplazo hormonal.	A
14	Nifedipina de acción corta o de liberación sostenida.	En pacientes con hipertensión grave se utiliza habitualmente hidralazina o labetalol por vía parenteral. El sulfato de magnesio es usado por 40% de los obstetras, 20% de los internistas y 27% de los médicos de familia. La nifedipina rara vez es indicada.	C
15	Alta sensibilidad y alta especificidad.	Diversos estudios mostraron que la ecocardiografía fetal es un método diagnóstico preciso, con una sensibilidad de 98% a 100% y especificidad de 95% a 96%.	B