

Autoevaluaciones de Lectura

Por cada artículo de la sección Artículos distinguidos se formula una pregunta, con cuatro opciones de respuesta. La afirmación acertada, que surge de la lectura atenta del trabajo, es citada en el apartado Respuestas Correctas, en esta misma página, acompañada de una breve fundamentación.

TD N°	Enunciación	Seleccione su opción
1	¿Qué efecto metabólico ejercen los anticonceptivos orales combinados en pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos?	A) Mejoran el metabolismo de los hidratos de carbono. B) No ejercen ningún efecto. C) Mejoran el perfil de lípidos. D) Inducen cambios desfavorables en la sensibilidad a la insulina.
2	¿Cuál de las siguientes opciones acerca de las células endometrióticas es correcta?	A) Su menor susceptibilidad a la apoptosis permite su desarrollo en ambientes desfavorables. B) La apoptosis sólo se observa en las células del endometrio ectópico. C) Las células de los quistes achocolatados son más susceptibles a la apoptosis. D) Las citoquinas disminuyen la supervivencia de las células endometrióticas de localización ectópica.
3	¿Cuáles son los serotipos del virus del papiloma humano involucrados con más frecuencia en patología cervical maligna?	A) 16 y 18. B) 33 y 34. C) 45 y 55. D) Depende de la edad de la paciente.
4	¿Cuál de las siguientes opciones acerca de la laparoscopia es correcta?	A) Los ginecólogos reciben entrenamiento en técnicas avanzadas en la residencia. B) Una de las dificultades es la imposibilidad de desempeñarse como primer cirujano. C) La falta de entrenamiento en laparoscopia se debe a la falta de interés. D) La insuficiente formación en laparoscopia no influye en el tiempo quirúrgico.
5	¿Qué efecto ejerce la tibolona sobre la concentración plasmática de homocisteína en mujeres posmenopáusicas?	A) Induce un aumento considerable. B) La droga no ocasiona cambios significativos después de 6 meses de tratamiento. C) El efecto depende de la concentración inicial de homocisteína. D) El efecto depende de la concentración basal de proteína C-reactiva.
6	¿Qué parámetros son útiles para evaluar la respuesta al tratamiento con metotrexato en mujeres con embarazo ectópico?	A) Hallazgos ultrasonográficos. B) Nivel de subunidad beta de gonadotropina coriónica humana (beta-hCG) al 1 ^{er} día del tratamiento. C) Niveles de beta-hCG al tercer día del tratamiento. D) Todos ellos.
7	Señale la opción correcta respecto del leuprolide acetato:	A) Posee menor unión al receptor que la GnRH endógena. B) Aumenta la secreción de gonadotropinas. C) Posee mayor degradación que la GnRH endógena. D) Su administración crónica suprime la esteroidogénesis.

Respuestas Correctas

Clave	Fundamentación	TD N°
D	La susceptibilidad atenuada a la apoptosis inducida en las células endometrióticas puede estar asociada a la supervivencia anormal en sitios ectópicos.	1
A	Los andrógenos principales en las mujeres son dehidroepiandrosterona (DHEA), DHEA sulfato, androstenediona, testosterona y dehidrotestosterona.	2
A	Los serotipos 16 y 18 son los que se encuentran involucrados con más frecuencia en patología maligna de cuello cervical.	3
B	Una de las dificultades es la imposibilidad de desempeñarse como primer cirujano durante la residencia es más marcada en los hospitales escuela universitarios, debido al nivel más alto de dificultad de los casos quirúrgicos.	4
B	La tibolona no ejerce efectos clínicamente relevantes sobre la concentración sérica de homocisteína.	5
D	Los ultrasonografías y los niveles de beta-hCG al primer día del tratamiento son muy importantes pero, en casos sin ruptura, la subunidad beta-hCG al tercer día es crucial para reevaluar la conducta y decidir una intervención.	6
D	El leuprolide acetato posee mayor unión al receptor y menor degradación que la GnRH endógena, actúa como un inhibidor de la secreción de gonadotropinas y su administración crónica suprime la esteroidogénesis.	7