

Autoevaluaciones de Lectura

Por cada artículo de las secciones Artículos Distinguidos se formula una pregunta, con cuatro opciones de respuesta. La afirmación acertada, que surge de la lectura atenta del trabajo, es citada en el apartado Resuestas Correctas, en esta misma página, acompañada de una breve fundamentación.

TD Nº	Enunciación	Seleccione su opción
1	Los criterios actuales para el diagnóstico del síndrome de ovarios poliquísticos incluyen:	A) Oligomenorrea o amenorrea. B) Hiperandrogenismo. C) Poliquistosis ovárica. D) Todas son correctas.
2	Señale la opción correcta respecto de las características de las mujeres con depresión posparto:	A) Las madres con depresión posparto presentan niveles séricos significativamente inferiores de cortisol en comparación con aquellas sin depresión. B) Las madres depresivas presentan niveles séricos inferiores y menor producción de interferón gamma. C) Los niveles séricos de interleuquina 6 fueron 3 veces más bajos entre las mujeres depresivas en comparación con las no depresivas. D) Los niveles séricos de prolactina de las madres depresivas fueron superiores en comparación con los niveles de las madres no depresivas.
3	Además del tipo, localización y extensión de las lesiones en el sistema nervioso, ¿qué otros factores deben evaluarse durante el tratamiento de la disfunción sexual en pacientes con trastornos neurológicos?	A) El sexo de los individuos. B) La presencia de limitaciones en la movilidad, trastornos afectivos (en especial, depresión) y medicación administrada. C) El antecedente de enfermedades previas. D) La historia familiar de trastornos de la función sexual.
4	¿Cuál es la principal ventaja de la detección de IGFBP-1?	A) Los resultados no son afectados por la presencia de sangre en vagina. B) Los resultados no varían por la presencia de semen u orina en las secreciones vaginales. C) La presencia de sangre en las secreciones cervicovaginales puede causar un falso negativo. D) Es ventajosa por su sencillez y bajo costo.
5	¿Cuál es la complicación posparto más frecuente observada en pacientes con preeclampsia y síndrome HELLP?	A) El compromiso neurológico por eclampsia. B) La presencia de edema pulmonar. C) Complicaciones infecciosas, como fiebre y abscesos. D) Insuficiencia renal aguda.
6	¿Cuál es el efecto que tiene sobre el dolor la confirmación histológica del diagnóstico de endometriosis?	A) El alivio del dolor pelviano no es afectado por la confirmación del diagnóstico visual de endometriosis. B) El dolor disminuyó sólo en los casos con confirmación histológica de endometriosis. C) La asociación de endosalpingiosis agravó el cuadro doloroso. D) El deterioro del efecto de la cirugía fue más marcado cuando existió inflamación peritoneal.
7	Señale cuál de los siguientes procedimientos corresponde a la acupuntura placebo:	A) Colocar agujas en puntos de acupuntura válidos que, de acuerdo con la medicina tradicional china, no abordan los síntomas blanco. B) Colocar agujas fuera de los canales de acupuntura. C) Emplear agujas placebo, que simulan la sensación de la acupuntura sin penetrar la piel. D) Todas son correctas.
8	¿Qué porcentaje de respuesta terapéutica a la doxorubicina en monoterapia muestran las mujeres con cáncer de endometrio?	A) Entre el 10% y el 30%. B) Inferior al 10%. C) Superior al 50%. D) Superior al 80%.

Respuestas Correctas

TD N°	Respuestas	Fundamentación	Clave
1	Todas son correctas.	Los criterios para diagnosticar síndrome de ovarios poliquísticos incluyen por lo menos 2 o 3 de las condiciones siguientes: oligomenorrea o amenorrea, hiperandrogenismo y poliquistosis ovárica.	D
2	Las madres depresivas presentan niveles séricos inferiores y menor producción de interferón gamma.	En comparación con las mujeres sin depresión, las madres con depresión posparto presentaron niveles salivales significativamente inferiores de cortisol. No obstante, no se observó una correlación entre los niveles séricos y salivales de la hormona. Las madres depresivas presentaron niveles séricos inferiores y menor producción de interferón gamma. Los niveles séricos de interleuquina 6 fueron 3 veces más elevados entre las mujeres depresivas. Los niveles séricos de prolactina de las madres depresivas fueron inferiores en comparación con los de aquellas no depresivas. Los títulos de anticuerpos contra el antígeno de la cápside viral del virus Epstein-Barr fueron levemente superiores en las madres depresivas.	B
3	La presencia de limitaciones en la movilidad, trastornos afectivos (en especial, depresión) y medicación administrada.	Además de la afección de los circuitos neurales, otros factores (fatiga, medicación recibida, pérdida de movilidad y de independencia, depresión) pueden alterar el desempeño sexual; estas variables deben considerarse en todo plan de rehabilitación destinado a los pacientes neurológicos.	B
4	Los resultados no varían por la presencia de semen u orina en las secreciones vaginales.	A diferencia de los métodos habituales, la prueba de detección de IGFBP-1 no es afectada por la presencia de semen, orina, flujo, o infecciones vaginales, aunque la sangre puede dar un resultado falso positivo.	B
5	Complicaciones infecciosas, como fiebre y abscesos.	Las infecciones son la complicación que se presenta con mayor frecuencia en el posparto, bajo la forma de fiebre > 38.5°C y abscesos; en tanto que los hallazgos de mayor gravedad fueron la eclampsia y los eventos tromboembólicos.	C
6	El alivio del dolor pélvico no es afectado por la confirmación del diagnóstico visual de endometriosis.	La endometriosis visualmente diagnosticada se confirma por histología en 62% de las muestras, pero resulta llamativo que el alivio de los síntomas sea independiente de dicha confirmación; lo que sugiere un efecto placebo de la cirugía.	A
7	Todas son correctas.	Los placebos en acupuntura toman tres formas: acupuntura no específica, acupuntura simulada y empleo de agujas placebo. La acupuntura no específica consiste en colocar agujas en puntos de acupuntura válidos que, de acuerdo con la medicina tradicional china, no abordan los síntomas blanco. La acupuntura simulada consiste en colocar agujas fuera de los canales de acupuntura. Las agujas placebo simulan la sensación de la acupuntura sin penetrar la piel.	D
8	Entre el 10% y el 30%.	De acuerdo con varios investigadores, la doxorubicina no es eficaz cuando se emplea como monoterapia ya que la tasa de respuesta oscila entre 10% y 30%, aunque la combinación con otros fármacos citotóxicos podría mejorar los resultados clínicos.	A