

## Autoevaluaciones de Lectura

Por cada artículo de las secciones Actualizaciones y Hallazgos se formula una pregunta, con cuatro opciones de respuesta. La afirmación acertada, que surge de la lectura atenta del trabajo, es citada en la página Respuestas Correctas, acompañada de una breve fundamentación.

TD N°	Enunciación	Seleccione su opción
1	¿Cuál es el antibiótico de elección para utilizar como profilaxis ante la sospecha de exposición a ántrax?	A) Ciprofloxacina. B) Cloranfenicol. C) Clindamicina. D) Ampicilina.
2	¿Cómo es el número de gérmenes, la frecuencia de patógenos y bacterias resistentes a antibióticos en las adenoides inflamadas respecto de la flora normal?	A) Menor. B) Similar. C) Mayor. D) Menor de gérmenes totales pero mayor de patógenos y bacterias resistentes.
3	¿Cuál se considera el microorganismo responsable de las erisipelas?	A) Los estreptococos. B) Los estafilococos. C) Los enterococos. D) Las pseudomonas.
4	¿Cuáles son los principales agentes causales de diarrea grave en menores de 5 años?	A) Torovirus. B) Adenovirus. C) Rotavirus. D) Coronavirus.
5	¿Qué efectos pueden tener los antibióticos liberados en el medio ambiente sobre la comunidad microbiana residente en los sedimentos cloacales?	A) Ninguno. B) Sobrecrecimiento bacteriano. C) Inhibición del crecimiento bacteriano. D) Selección de bacterias resistentes.
6	¿Qué tipo de patología bucal pueden presentar los individuos sometidos a radioterapia para el tratamiento de patologías en cabeza y cuello?	A) Candidiasis oral. B) Cancrum oris. C) Mucositis oral. D) Gingivitis ulcerosa necrotizante.
7	¿Cuál es la terapia antibiótica de elección en adultos inmunocompetentes con neumonía adquirida en la comunidad que requieren cuidados intensivos?	A) Amoxicilina más ácido clavulánico o ampicilina más sulbactam. B) Fluoroquinolonas con mayor actividad antineumocócica. C) Cefalosporinas de 3ª o 4ª generación endovenosas más azitromicina o claritromicina. D) Cefalosporinas de 2ª o 3ª generación
8	¿Cómo se considera que se originó la epidemia de sífilis en Europa en el siglo XV?	A) Fue traída por los marinos que viajaban con Colón. B) Fue traída del África. C) Fue traída de Asia. D) Se diseminó a partir de Francia.
9	¿Cuál de los siguientes parámetros se asocia con mayor riesgo de recurrencia de osteomielitis?	A) Infección por estreptococo no D. B) Infección por <i>P. aeruginosa</i> . C) Infección por <i>S. aureus</i> . D) Todas por igual.
10	¿Qué utilidad tienen los criterios de los autores para identificar pacientes de bajo riesgo con neumonía que serán internados, respecto del índice de gravedad?	A) Mayor. B) Menor. C) Similar. D) Levemente inferior.
11	¿Cuál es la vía principal de contagio del virus herpes tipo 2?	A) Neonatal. B) Intrauterina. C) Sexual. D) Por hemoderivados.
12	¿Cuál fue el efecto adverso más grave de la reinstalación de la vacuna antivariólica?	A) Encefalomielitis. B) Miopericarditis. C) Foliculitis. D) Eccema posvacunal.

## Autoevaluaciones de Lectura

### Respuestas Correctas

TD N°	Respuestas	Fundamentación	Clave
1	Ciprofloxacina.	La ciprofloxacina es el antibiótico de elección y debe mantenerse durante al menos 4 semanas.	A
2	Mayor.	En las adenoides inflamadas o hipertrofiadas se encuentra una flora semejante a la de los individuos normales, aunque con un mayor número de microorganismos y una frecuencia más elevada de patógenos y bacterias resistentes a los antibióticos.	C
3	Los estreptococos.	La erisipela es una infección bacteriana aguda de la dermis y la hipodermis. Es causada principalmente por estreptococos y, actualmente, no existen pruebas de que otras bacterias puedan causar la erisipela típica.	A
4	Rotavirus.	La infección por rotavirus es la causa más frecuente de diarrea grave en menores de 5 años.	C
5	Selección de bacterias resistentes.	Los antimicrobianos presentes en los sistemas de desagüe hospitalarios, alcantarillas, tanques de aireación, en el proceso de digestión anaeróbica del sistema de tratamiento cloacal o en el suelo son capaces de seleccionar bacterias resistentes.	D
6	Mucositis oral.	La mucositis oral es una de las patologías que pueden presentar los sujetos sometidos a radioterapia para el tratamiento de patologías en cabeza y cuello.	C
7	Cefalosporinas de 3ª o 4ª generación endovenosas más azitromicina o claritromicina.	El tratamiento de elección en este tipo de pacientes, en los cuales los patógenos aislados con mayor frecuencia son <i>S. pneumoniae</i> , <i>Legionella</i> spp, bacterias gramnegativas, <i>M. pneumoniae</i> y virus respiratorios, son las cefalosporinas de 3ª o 4ª generación endovenosas más azitromicina o claritromicina.	C
8	Fue traída por los marinos que viajaban con Colón.	La gran epidemia de sífilis a fines del siglo XV en Europa se atribuye a los viajes transatlánticos de Cristóbal Colón en 1492. Durante el viaje, los marineros cohabitaron con nativas, y adquirieron la enfermedad, que fue posteriormente diseminada por Europa.	A
9	Infección por <i>P. aeruginosa</i> .	La recuperación inicial de <i>P. aeruginosa</i> es un factor predictivo de pronóstico adverso.	B
10	Mayor.	La utilización de los nuevos criterios permite la identificación de este subgrupo de pacientes, a diferencia de la aplicación estricta del índice de gravedad de neumonía.	A
11	Sexual.	La infección se adquiere casi siempre por contacto sexual y es causa de ulceración genital.	C
12	Miopericarditis.	Se presentó en 18 de los militares vacunados. Su incidencia posiblemente esté relacionada con mejores métodos para el diagnóstico y mayor sospecha clínica.	B