

---

## ● **Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas**

---

### **CARACTERISTICAS DE LAS BACTERIAS GRAMNEGATIVAS MULTIRRESISTENTES**

**D.** Beta lactamasas que hidrolizan a las oximino-cefalosporinas y que el ácido clavulánico inhibe.

**Fundamentación:** Beta lactamasas que hidrolizan a las oximino-cefalosporinas y que el ácido clavulánico inhibe.

---

### **PREVALENCIA Y RIESGO DE CONTRAER TOXOPLASMOSIS DURANTE EL EMBARAZO**

**B.** Como una infección generalmente autolimitada de los adultos inmunocompetentes.

**Fundamentación:** La toxoplasmosis es una infección de los adultos inmunocompetentes, habitualmente autolimitada.

---

### **MECANISMOS BACTERIANOS INVOLUCRADOS EN LA ENFERMEDAD POR *ESCHERICHIA COLI***

**D.** Todos ellos.

**Fundamentación:** La desaparición de la microvellosidades intestinales, el desarreglo [la alteración] del citoesqueleto en las células huésped y las alteraciones en el transporte de iones son esenciales en la aparición de la diarrea asociada con la infección por estas bacterias.

---

### **LA SIFILIS EXISTIA EN AMERICA ANTES DE LA LLEGADA DE COLON**

**D.** La sífilis se encontraba presente en el Nuevo Mundo al momento de la llegada de Colón.

**Fundamentación:** La evidencia ósea documenta la presencia de sífilis en República Dominicana, donde desembarcó Colon.

---

### **ASOCIACION ENTRE INFECCION POR VIRUS DE HEPATITIS C Y MARCADORES DE AFECTACION DEL SISTEMA NERVIOSO**

**C.** Eficiencia del aprendizaje.

**Fundamentación:** Solamente en la prueba que valoró la eficiencia del aprendizaje se observaron diferencias significativas.

---

## **LA INTERACCION ENTRE ACIDO VALPROICO Y MEROPENEM PUEDE TENER EFECTOS ADVERSOS GRAVES**

**A.** Alto.

**Fundamentación:** El ácido valproico tiene un alto potencial de interacción farmacocinética con otros fármacos debido a su forma de metabolización hepática.

---

## **REVISION SOBRE EL SINDROME DE RECONSTITUCION INMUNOLOGICA**

**C.** La gran mayoría de los casos aparecen en pacientes con un recuento de linfocitos CD4+ menor de 100 células/ $\mu$ l al inicio de la TARGA.

**Fundamentación:** Otros datos presentes son la carga viral mayor de 100 000 copias/ml y una rápida respuesta al tratamiento antirretroviral combinado de alta eficacia.

---