



Volumen 8, Número 5, Noviembre 2005

● Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

INDICACIONES DE VANCOMICINA EN LAS INFECCIONES POR *STAPHYLOCOCCUS AUREUS*

B. Bactericida a dosis altas.

Fundamentación: La vancomicina inhibe la síntesis de la pared celular de una variedad de bacterias grampositivas y, por lo tanto, es un fármaco bactericida.

CAMBIOS EN LA CARGA VIRAL Y VARIACIONES DE ENZIMAS HEPATICAS EN COINFECTADOS CON HIV Y VHC

C. Marcado descenso de la carga viral para el HIV con incrementos en la carga del VHC, independientemente del inhibidor de la proteasa empleado en la TARGA.

Fundamentación: Se han detectados incrementos en la carga viral del VHC luego del inicio de la TARGA. Este aumento se asoció con una reconstitución inmunológica apropiada y pueden acompañarse de elevaciones agudas en los niveles de ALT.

TERAPIA ANTIRRETROVIRAL DE GRAN ACTIVIDAD Y RIESGO DE FIBROSIS HEPATICA

D. Todos los anteriores.

Fundamentación: En la hepatitis crónica se encuentran todos los signos mencionados, que pueden llevar a la aparición de cirrosis hepática descompensada.

HEPATOTOXICIDAD EN PACIENTES CON COINFECCION POR HIV Y VIRUS DE LA HEPATITIS C BAJO TERAPIA ANTIRRETROVIRAL DE GRAN ACTIVIDAD

C. Debe determinarse en forma individual.

Fundamentación: La decisión de tratar la hepatitis C en personas con infección por HIV debe hacerse en forma individual.
