



Sociedad Argentina de
Medicina Farmacéutica

Volumen 1, Número 5, Abril 2005



México

Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

MEDICION DE LA PRESION ARTERIAL COMO PARAMETRO DE EFICACIA ANTIHIPERTENSIVA

B. Valores elevados de TA clínica y bajos de TA ambulatoria.

Fundamentación: La hipertensión denominada de "guardapolvo blanco" se define según los criterios de la Sociedad Europea de Hipertensión como valores elevados de TA clínica y bajos de TA ambulatoria.

DIFUNDEN NORMAS EUROPEAS PARA PREVENCION CARDIOVASCULAR EN CLINICA MEDICA

C. 100 mg.

Fundamentación: La dosis de aspirina recomendada en prevención primaria de la enfermedad coronaria es de no más de 100 mg diarios.

LOS PACIENTES DEBERIAN SER INFORMADOS EN CASO DE RECIBIR MEDICACION PROSCRIPTA POR SU RELIGION

B. La mayoría de los graduados en el extranjero creían que era importante.

Fundamentación: La mayoría de los graduados en universidades extranjeras creían en la importancia de proporcionar esa información.

INTERES DE LOS PARTICIPANTES POR CONOCER LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS CLINICOS EN LOS QUE PARTICIPAN

D. La inquietud por conocer los resultados se asoció con el nivel de educación de las participantes.

Fundamentación: Fue más probable que las mujeres con mejor nivel educativo eligieran conocer sus resultados, ya que 57 (el 67% de las 85 que eligieron esta opción) eran graduadas universitarias.