



Volumen 15, Número 6, Agosto 2004

● Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

DESCRIBEN LAS VENTAJAS DE LA APLICACION DE LA GENETICA EN ONCOLOGIA CLINICA

D. Todas las drogas anteriores.

Fundamentación: La experiencia en el tratamiento de ese tipo de neoplasia con la combinación estándar permite afirmar la respuesta.

NUEVA TECNICA PARA LA DETECCION DEL GANGLIO CENTINELA MAMARIO

C. Porque tiene menor peso molecular, lo que permite su rápida difusión linfática.

Fundamentación: El iopamidol parece penetrar fácilmente en los vasos linfáticos a través de los espacios presentes en las linfangiolas terminales del espacio intersticial; ocurre algo similar con otras sustancias hidrosolubles de bajo peso molecular. La relativa larga duración del realce logrado con iopamidol puede deberse a una transición lenta y secuestro del iopamidol en los sinusoides ganglionares.

CARACTERISTICAS DE LOS TUMORES CARCINOIDES HEPATICOS PRIMARIOS

C. Hueso.

Fundamentación: El hueso es uno de los sitios de metástasis más frecuentes de los tumores carcinoides hepáticos primarios.

COMPARACION DE TECNICAS POR IMAGENES PARA LA DETECCION PREOPERATORIA DEL CARCINOMA HEPATOCELULAR

C. Los autores recomiendan que la combinación de las técnicas de RM realizadas con Gd-DTPA y SPIO reemplacen a la combinación de AHTC y PATC.

Fundamentación: Los resultados de este estudio confirmaron que la precisión diagnóstica, sensibilidad y especificidad de las imágenes por RM combinadas y realizadas con SPIO y Gd-DTPA para la detección de CHC fueron similares a las observadas con la combinación de los estudios tomográficos AHTC y PATC, por lo cual se puede obviar la necesidad de realizar estos dos últimos procedimientos como parte de la evaluación preoperatoria.
