



Volumen 17, Número 3, Agosto 2006

## Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

### LA PRESERVACION DE LA FERTILIDAD ES FACTIBLE EN MUJERES TRATADAS POR DIVERSAS NEOPLASIAS

D. Todas ellas.

**Fundamentación:** La preservación de embriones y ovocitos y de tejido ovárico y la protección ovárica con análogos de hormona liberadora de gonadotropinas representan formas de preservar la fertilidad en niñas y mujeres jóvenes sometidas a tratamiento antineoplásico. Cada una se asocia con ventajas y desventajas que deberán analizarse en cada caso en particular.

### TERAPIA DEL CANCER COLORRECTAL CON DROGAS DIRIGIDAS A DIFERENTES BLANCOS

B. Inhibidores de la tirosinquinasa, anticuerpos para el factor de crecimiento epidérmico y anticuerpo para el factor de crecimiento vascular endotelial.

**Fundamentación:** Los inhibidores de la tirosinquinasa, los anticuerpos para el factor de crecimiento epidérmico y el anticuerpo para el factor de crecimiento vascular endotelial son agentes bloqueantes específicos de algunas funciones de las células neoplásicas que, al asociarse con las drogas quimioterápicas antineoplásicas, actuarían en forma sinérgica con ellas y mejorarían los resultados que se obtienen cuando estas últimas se suministran en forma exclusiva.

### LA PROSTATECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA PODRIA SER DE ELECCION EN CANCER DE PROSTATA

B. Equivalente a la reportada en la literatura

**Fundamentación:** La continencia en la prostatectomía radical laparoscópica oscila entre un 80 y 95%, frecuencia equivalente a la observada tras la cirugía "abierta". En la experiencia descrita aquí por los autores, la continencia a los 3 meses fue del 85%.

Trabajos Distinguidos, Serie Oncología, integra el Programa SIIC-ASARCA de Educación Médica Continuada