



Volumen 17, Número 4, Septiembre 2006

● Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

ANALIZAN FACTORES PREDICTIVOS DE TOXICIDAD POR DOCETAXEL EN DOSIS SEMANALES

C. Neutropenia febril.

Fundamentación: Los efectos adversos secundarios abarcan neutropenia, neutropenia febril, linfopenia, trombocitopenia, náuseas, vómitos, diarrea, anorexia, astenia, infecciones y reacciones alérgicas.

LA COMBINACION DE 2 METODOS DIAGNOSTICOS PODRIA EVITAR LA MEDIASTINOSCOPIA EN EL CANCER PULMONAR

A. A través de un broncoscopio rígido o flexible.

Fundamentación: En la década de 1950, el cirujano argentino Eduardo Schieppati publicó la biopsia transcarinal para obtener muestras de adenomegalias mediastinales. La realizaba con una aguja larga y fina que actualmente lleva su nombre. En la década de 1970 se incorporó al arsenal diagnóstico el broncoscopio flexible inventado por Ikeda, quien aplicó la fibra óptica para iluminación y obtención de imágenes. Al poco tiempo, Wang creó una aguja flexible que puede llevarse envainada hasta la pared indemne de la tráquea o de los bronquios y, una vez apoyada en el sitio apropiado, desenvainarse para penetrar hasta una estructura opuesta a la cara exterior de la vía aérea. El invento más reciente es la ultrasonografía endoscópica de los bronquios, que sirve para identificar el sitio que se desea punzar y guiar la progresión del extremo de la aguja hasta que quede alojada en el sitio apropiado de donde obtener muestras citológicas por aspiración.

PAPEL DE LA RADIOTERAPIA EN EL TRATAMIENTO PALIATIVO DE NEOPLASIAS GASTROINTESTINALES

D. Todas son correctas.

Fundamentación: Para el tratamiento de la esofagitis con radioterapia puede emplearse una mezcla de difenhidramina, magnesio y lidocaína.

DESCRIBEN CONSECUENCIAS TARDIAS DE LAS TERAPIAS CONTRA EL CANCER EN NIÑOS

A. Hipotiroidismo.

Fundamentación: El trastorno más frecuente es el hipotiroidismo y los pacientes que recibieron radioterapia en la zona del cuello son los que muestran el mayor riesgo.

EL GOSERELIN PROLONGA LA SUPERVIVENCIA EN PREMENOPAUSICAS CON CANCER DE MAMA TEMPRANO

C. Ambos efectos.

Fundamentación: El agregado de goserelín a la terapia adyuvante convencional prolonga la supervivencia global y libre de eventos en mujeres con cáncer de mama precoz.

Trabajos Distinguidos, Serie Oncología, integra el Programa SIIC-ASARCA de Educación Médica Continuada