



Volumen 17, Número 5, Octubre 2006

● Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

LA SUPRESIÓN DE ANDRÓGENOS MEJORA LOS RESULTADOS DE LA RADIOTERAPIA EN EL CARCINOMA DE PRÓSTATA

B. Ilíacos externos, internos y comunes.

Fundamentación: El drenaje linfático de la próstata se realiza hacia los ganglios paraórticos, hasta llegar a ellos por los ilíacos internos, externos y comunes, que acompañan a los vasos homónimos. Las metástasis ganglionares regionales se producen en los mencionados ganglios radicados en la pelvis.

LA HIPERTERMIA MEJORA LOS RESULTADOS DE LA RADIOTERAPIA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO

A. Células epiteliales del revestimiento cervical.

Fundamentación: Las células del endometrio originan adenocarcinomas del cuerpo uterino, las del miometrio generan sarcomas no carcinomas y las del fondo de saco vaginal no producen cáncer cervical sino que cuando el cuello se encuentra afectado se debe a la progresión local.

ANALIZAN NIVELES DE ANTÍGENO PROSTÁTICO Y SUPERVIVENCIA EN CÁNCER DE PRÓSTATA

C. Si el nivel se reduce se infiere respuesta adecuada al tratamiento.

Fundamentación: El antígeno prostático específico es un marcador biológico que refleja en sangre la cantidad de tejido prostático funcionante. En el cáncer de próstata (también en la prostatitis) se eleva a valores que superan los 5 ng. Demostrado el cáncer mediante biopsia, la institución de tratamiento produce el descenso del nivel sanguíneo del APE cuando la respuesta es favorable. La recurrencia produce nueva elevación.

Trabajos Distinguidos, Serie Oncología, integra el Programa SIIC-ASARCA de Educación Médica Continuada