

Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

ENVEJECIMIENTO Y FRACTURAS OSTEOPOROTICAS

C. La disminución de la densidad mineral ósea.

Fundamentación: El aumento brusco del riesgo es el resultado de la disminución de la densidad mineral ósea en el fémur proximal -un indicador indirecto de la fragilidad ósea- y el aumento de la frecuencia de caídas a medida que aumenta la edad.

TRATAMIENTO QUIRURGICO O CONSERVADOR PARA LAS RADICULOPATIAS POR HERNIA DE DISCO

D. L4-L5 y L5-S1.

Fundamentación: En un 82% de los casos el nivel de la patología discal se ubicó en L4-L5 o L5-S1.

CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS DEL SINDROME DEL TUNEL CARPIANO EN UNA POBLACION ITALIANA

A. Entre 50 y 59 años.

Fundamentación: La mayor frecuencia del síndrome del túnel carpiano se detecta entre los 50 y 59 años.

NO SIEMPRE SE RECONOCE EL RIESGO DE LESION MEDULAR EN NIÑOS CON TRAUMATISMOS CERVICALES

B. Cuando el examen clínico es normal.

Fundamentación: La inmovilización debe mantenerse hasta que el examen clínico adecuado descarte la existencia de lesión, independientemente del resultado del examen radiológico.